F-08/2026

BENZAPEN L.A.®

Antibiótico + antiinflamatorio no esteroideo

Suspensión Inyectable

Indicaciones:

Para el tratamiento de neumonías, septicemias, neumoenteritis, panadizo, difteria, mastitis, leptospirosis, carbón sintomático, erisipela, causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos. Flunixin favorece la eliminación de procesos inflamatorios en menor tiempo.

Composición:

Penicilina G Procaínica	100.000 UI
Penicilina G Benzatínica	100.000 UI
Dihidroestreptomicina base	200 mg
Flunixin Meglumine	15 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Registro:

Ecuador Reg. No. 2B2-9974-AGROCALIDAD

Presentación:

Frasco x 10 mL
Frasco x 50 mL
Frasco x 100 mL
Frasco x 250 mL



Aplicación:

Vía intramuscular.

Dosis:

Bovinos - Equinos:
1 mL por 20 kg de peso.
Porcinos - Ovinos:
1 mL por 20 kg de peso.
Caninos:
1 mL por 10 kg de peso.
En todos los casos, repetir el tratamiento en 48 horas.

Advertencias:

- En caso de reacciones alérgicas aplicar antihistamínicos o epinefrina.

Conserve en refrigeración entre 2º a 8ºC.
No congelar.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario.

Periodo de Retiro:

- **Carne:** 30 días.
- **Leche:** 3 días.

Aplícalo en:





JB® JAMES BROWN | Salud Animal

Quito: Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.
PBX: +593 2 399 7000