DOMAX®

F-02/2026

Antiparasitario interno y externo

Solución Inyectable

Indicaciones:

Para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares; ectoparásitos como garrapatas, ácaros, piojos, larvas de insectos (nuche, gusaneras superficiales y cavitarias) en bovinos, ovinos y porcinos.

Composición:

Cada mL contiene:

Doramectina	10 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Registro:

Ecuador Reg. No. 3A1-10461-AGROCALIDAD

Aplicación:

Vía subcutánea en el pliegue del cuello o tras la escápula.

Presentación:

Frasco x 10 mL
Frasco x 50 mL
Frasco x 100 mL
Frasco x 500 mL



Dosis:

Bovinos y Ovinos: 200 ug/kg de peso, equivalente a 1 mL por cada 50 kg de peso vivo, vía intramuscular o subcutánea.
Porcinos: 300 ug/kg de peso, equivalente a 1 mL por cada 33 kg de peso vivo.

Advertencias:

En las dosis recomendadas no causa reacciones adversas, en caso de presentarse aplicar antihistamínicos o epinefrina.
No aplicar a vacas, cuya producción de leche está destinada al consumo humano.
No utilizar junto con organofosforados.
Evite que el producto contamine fuentes de agua, es nocivo para la fauna acuática.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

Periodo de Retiro:

Carne de Bovinos y Ovinos: 35 días.
Porcinos: 28 días antes del sacrificio.

Aplícalo en:



JB JAMES BROWN | Salud Animal

Quito: Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

PBX: +593 2 399 7000