

Producto:

FLUNIXIN

Solución Inyectable
Antiinflamatorio

Composición:

Cada mL contiene:	
Flunixin meglumine	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

FICHA TÉCNICA

Presentaciones:

Frasco x 20 mL
Frasco x 50 mL
Frasco x 100 mL



Indicaciones:

Compuesto analgésico, antiinflamatorio, antipirético destinado para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos, cólico, enfermedad respiratoria, cirugía en general en equinos. Alteraciones osteomusculares, mastitis, metritis, vaca caída, enfermedad respiratoria en bovinos. Síndrome de mastitis, metritis, agalactia en porcinos.

Especies y Dosis:



Bovinos: 2 mL / 45 kg, cada 24 horas por 1 a 3 días.
Equinos: 1 mL / 45 kg, cada 24 horas por 1 a 5 días.
Porcinos: 2 mL / 45 kg, cada 24 horas por 1 a 3 días.

Registros:



Ecuador Reg. No. 2C4-04693-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 010857/22
Guatemala MAGA No. EC432-14-02-12132
Perú Reg. SENASA No. F.99.01.I.0099
Paraguay Reg. SENACSA No. 19185
República Dominicana Reg. No. 11690

Aplicación:

Vía intravenosa e intramuscular.

Advertencias:



Usar con precaución en los animales con úlcera gastrointestinal, enfermedad renal, hepática, hematológica o antecedentes de hipersensibilidad. Cuando se usa como analgésico, si el animal no responde a la dosis inicial, es poco probable que las dosis adicionales sean efectivas y estas pueden incrementar las posibilidades de toxicidad. Usar con cuidado en animales gestantes. La administración endovenosa debe ser lenta. Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz. **Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.** Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

Periodo de Retiro:

Carne de bovinos y porcinos: 7 días.
Leche: 24 horas.



Uso Veterinario

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 399-7000
www.jamesbrownpharma.com