

Producto:

FORTIPEN

Polvo + Diluyente (suspensión inyectable)

Antibiótico - Antiinflamatorio

FICHA TÉCNICA

Composición:

Cada mL contiene:	
Penicilina G Procaínica	150.000 U.I.
Penicilina G Sódica	150.000 U.I.
Estreptomina	300 mg
Diclofenaco Sódico	15 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Presentación:

Frasco x 20 mL



Indicaciones:

Acción efectiva contra bacterias gram positivas y negativas causantes de neumonías, septicemias, panadizos, mastitis, actinomycosis y leptospirosis. También efectiva en infecciones del ombligo, castraciones y otras intervenciones quirúrgicas en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

Especies y Dosis:



1 mL por cada 20 kilos de peso

Bovinos	20 mL
Equinos	15 mL
Novillos - Potros	10 mL
Terneros - Ovejas - Porcinos	3-8 mL

Aplicar cada 12 horas por un máximo de 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Registros:



Ecuador Reg. No. 2C4-8800-AGROCALIDAD
 Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005550/13
 Guatemala MAGA No. EC432-07-01-11775
 Venezuela Reg.No. INSAI2041PI33N077948
 Perú Reg. SENASA No. F.03.13.I.1336
 Panamá: RF-3830-22

Aplicación:

Vía intramuscular profunda.
 Para reconstituir introduzca el diluyente en el frasco que contiene el polvo y agite hasta obtener una suspensión uniforme.

Advertencias:



En caso de producirse reacciones alérgicas aplique antihistamínicos o epinefrina.
 Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

Periodo de Retiro:

Carne: 28 días
Leche: 3 días



ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
 Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
 Quito - Ecuador
 PBX: (593-2) 399-7000
 www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario