

**Producto:**

**NEW+BRON**

Liofilizado + Diluyente

Vacuna Aviar contra Newcastle y Bronquitis Infecciosa

**FICHA TÉCNICA**

**Composición:**

|  |  |
|--|--|
| Cultivo de virus vivo modificado cepa      |  |
| La Sota tipo B1 10 <sup>5.5</sup> EID 50%. |  |
| Cultivo de virus vivo modificado cepa      |  |
| Massachusetts 10 <sup>5.5</sup> EID 50%.   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Presentaciones:**

- Frasco x 50 dosis
- Frasco x 100 dosis
- Frasco x 500 dosis
- Frasco x 1000 dosis + Diluyente



**Indicaciones:**

Vacuna para la prevención e inmunización de aves sanas (reproductoras, pollas de reemplazo y pollos de engorde) contra las enfermedades de Newcastle y Bronquitis infecciosa aviar.

**Especies y Dosis:**



**Aves:**

Una gota en el ojo o nariz.

Agua de bebida de acuerdo a las siguientes indicaciones:

**Litros de agua**

| Edad de ave       | 50 Ds | 100 Ds | 500 Ds | 1000 Ds |
|-------------------|-------|--------|--------|---------|
| 10 a 20 días      | 0.5   | 1      | 5      | 10      |
| 8 semanas         | 1     | 2      | 10     | 20      |
| Más de 12 semanas | 2     | 4      | 20     | 40      |

**Aplicación:**

Vía ocular, nasal, agua de bebida y aspersión.

**Registros:**

Ecuador Reg. No. 4A-12052-AGROCALIDAD

**Advertencias:**



Controle que todas las aves tengan acceso al mismo tiempo al agua con vacuna.

Evite otras fuentes de suministro de agua.

Una vez reconstituido use inmediatamente el producto, no guarde sobrantes.

Incinere los envases y los sobrantes.

Conserve en refrigeración entre 2° a 8° C. No congelar.

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.



**ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,  
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.

Quito - Ecuador

PBX: (593-2) 399-7000

www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario