

Producto:

POLYMAST ROJO

Suspensión Intramamaria
Antimastítico

Composición:

Cada jeringa de 10 mL contiene:	
Sulfato de neomicina	100 mg
Gramicidina	2 mg
Polimixina B	18 mg
Flumetasona	1 mg
Excipientes c.s.p.	10 mL

FICHA TÉCNICA

Presentaciones:

Jeringa x 10 mL
Caja x 24 jeringas
Balde x 48 jeringas



Indicaciones:

Para el tratamiento de mastitis clínicas, agudas y subclínicas ocasionadas por *Streptococcus uberis*, *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Aerobacter aerógenes*, *Pseudomona spp.*

Especies y Dosis:



Bovinos:

Una jeringa de 10 mL por cada cuarto por 3 días.

Registros:



Ecuador Reg. No. 2C1-6915-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005040/12
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N078737
Registro Sencamer Nro.: CPE0511220823

Aplicación:

Vía intramamaria por el canal del pezón en el o los cuartos afectados.

Periodo de Retiro:

Carne: 6 días después de la última aplicación.
Leche: 3 días

Advertencias:



La leche de los animales en tratamiento no utilice para consumo humano o industrial.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.



ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 399-7000
www.jamesbrownpharma.com

Uso Veterinario