Fortipen®

F-02/2026

Antibiótico + Antiinflamatorio no esteroideo

Polvo + Diluyente

Indicaciones:

Acción efectiva contra bacterias gram positivas y negativas causantes de neumonías, septicemias, panadizos, mastitis, actinomicosis y leptospirosis. También efectiva en infecciones del ombligo, castraciones y otras intervenciones quirúrgicas en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

Composición:

Una vez reconstituido cada mL contiene:

Penicilina G Procaínica	150.000 U.I.
Penicilina G Sódica	150.000 U.I.
Estreptomicina	300 mg
Diclofenaco Sódico	15 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Aplicación:

Vía intramuscular profunda.
Para reconstituir introduzca el diluyente en el frasco que contiene el polvo y agite hasta obtener una suspensión uniforme.

Dosis:

1 mL por cada 20 kilos de peso
Bovinos: 20 mL
Equinos: 15 mL
Novillos - Potros: 10 mL
Terneros - Ovejas - Porcinos: 3-8 mL
Aplicar cada 12 horas por un máximo de 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Advertencias:

En caso de producirse reacciones alérgicas aplique antihistamínicos o epinefrina.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

Periodo de Retiro:

Carne 28 días.
Leche 3 días.

Registro:

Ecuador Reg. No. 2C4-8800-AGROCALIDAD

Presentación:

Frasco de polvo +
Frasco de Diluyente
20 mL



Aplícalo en:





JB JAMES BROWN Salud Animal

Quito: Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.
PBX: +593 2 399 7000