

PRODUCTO:

OXITER 200 L.A.
Antibiótico + antiinflamatorio
Solución Inyectable.

PARA ESPECIES:



DESCRIPCIÓN:

Antibiótico de amplio espectro más antiinflamatorio no hormonal.

COMPOSICIÓN:

Contiene:

Oxitetraciclina base
Flunixin meglumine

INDICACIONES:

Para el tratamiento de infecciones por gérmenes gram positivos y gram negativos causantes de pasteurelisis, colibacilosis, salmonelosis, anaplasmosis, difteria, metritis, pododermatitis y neumonías.

DOSIS:

Bovinos: 1 ml x cada 20 kg de peso.
Equinos: 1 ml x cada 20 kg de peso.
Porcinos: 0,5 a 1 ml x cada 10 kg de peso.

Repetir el tratamiento a las 48 horas.

ADVERTENCIAS:

- La aplicación intramuscular en bovinos en algunos casos puede causar irritación y un cierto grado de necrosis, por lo que en esta especie debe preferirse la vía intravenosa.
- No administrar a hembras gestantes, no usar en caso de daño renal o hepático severo.
- No aplicar en equinos en entrenamiento en los 8 días previos a la carrera.
- Oxitetraciclina tiene un amplio margen de seguridad, no administre junto con penicilinas, soluciones de calcio, aluminio, hierro, son incompatibles.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- **Tiempo de Retiro:** Leche: No administrar en vacas en producción de leche destinada al consumo humano.
Carne: 28 días.
- Eliminar los envases en lugares autorizados
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

REGISTROS:

Ecuador Reg. No.2C1-8A4-11699-AGROCALIDAD
Guatemala MAGA No. EC432-07-01-3027

Perú Reg. SENASA No. F.71.01.I.0070
Bolivia Reg. SENASAG PUV-F No.005553/13



PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml
Frasco x 100 ml
Frasco x 250 ml

APLICACIÓN:

Vía intramuscular profunda, intravenosa lenta con solución dextrosada, en lavados uterinos diluido en agua destilada.

Uso Veterinario.

