

Producto:

PIROBENZ PLUS

Solución Inyectable
Antihematozoárico

Composición:

| | |
|---------------------------------------------|--------|
| Cada mL contiene: | |
| Oxitetraciclina base | 100 mg |
| Diaceturado de 4'4 diazoamino dibenzamidina | 40 mg |
| Antipirina | 110 mg |
| Excipientes c.s.p. | 1 mL |
| | |
| | |
| | |
| | |

FICHA TÉCNICA

Presentaciones:

Frasco x 50 mL
Frasco x 100 mL
Frasco x 250 mL



Indicaciones:

Para el tratamiento de piroplasmosis, anaplasmosis (fiebre de garrapata), tripanosomiasis (mal de caderas) transmitido por garrapatas, en los bovinos, equinos y caninos sensibles.
La aplicación oportuna es suficiente para el control de las enfermedades ocasionadas por hematozoarios.

Especies y Dosis:



Bovinos, equinos y caninos

(3.5 mg / Kg) - 1 mL por cada 10 kilos de peso.
En casos necesarios repetir la dosis a las 24 horas.

Registros:



Ecuador Reg. No. 2C1-6920-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 001000/05
Guatemala MAGA No. EC432-42-01-7540
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N079447
Registro Sencamer Nro.: CPE0511220816
Paraguay Reg. SENACSA No. 19186
Panamá: RF-9076-21

Aplicación:

Vía intramuscular profunda.

Periodo de Retiro:

Carne: 21 días
Leche: 4 días

Advertencias:



Desinfecte el sitio de aplicación.
En equinos divida la dosis en dos partes y administre con intervalo de 3 horas.
Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.



Uso Veterinario

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 399-7000
www.jamesbrownpharma.com