

**Producto:**

## TICKXAN

Solución Tópica  
Antiparasitario Externo


## FICHA TÉCNICA

**Composición:**

Cada 100 mL contiene:	
Flumetrina	1,0 g
Fluazurón	2,5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

**Presentaciones:**

Frasco x 250 mL  
Frasco x 1 litro



**Indicaciones:**

Para el control y tratamiento de ectoparásitos como: garrapatas, piojos y ácaros que afectan a los bovinos, ovinos y caprinos.

**Especies y Dosis:**



**Bovinos, ovinos y caprinos:** 1 mL/10 kg de peso, equivalente a 1 mg/kg de Flumetrina y 2.5 mg/kg de Fluazurón.



Se recomienda repetir el tratamiento a los 35 días o a criterio del médico veterinario, dependiendo del grado de infestación y la prevalencia de los parásitos en el lugar.

**Aplicación:**

Vía tópica, a lo largo de la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola.

**Registro:**

Ecuador Reg. No. RIP-FAR-13

**Advertencias:**



A la dosis indicada no presenta contraindicaciones.  
No aplicar sobre piel lesionada ya que puede provocar intoxicaciones.  
Durante la aplicación del producto el operador debe usar guantes de látex, no comer ni beber para evitar intoxicaciones.  
Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.  
**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**  
Venta Libre.

**Periodo de Retiro:**

**Carne:** 42 días antes del sacrificio del animal.  
**Leche:** No aplicar en vacas en producción de leche destinada al consumo humano.



**ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,  
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.  
Quito - Ecuador  
PBX: (593-2) 399-7000  
www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario