

Producto:

CARPROVET 25 mg

Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético

Tabletas

Composición:

Cada tableta contiene:


Carprofeno 25 mg, Excipientes c.s.p. 1 tab.


Peso tableta: 660 mg.

FICHA TÉCNICA

JB
JAMES BROWN
PHARMA

Presentaciones:

 Caja x 12 tabletas

 Frasco x 30 tabletas.

Indicaciones:


Sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, hacen de este AINE el tratamiento ideal para el manejo y alivio del dolor, generado por procedimientos quirúrgicos y sucesos traumáticos en caninos.

Su posible especificidad inhibitoria sobre la ciclooxigenasa-2 (COX 2), la fosfolipasa A2 y la síntesis de prostaglandinas, permiten su administración por largos periodos sin los consecuentes efectos secundarios de otros antiinflamatorios no esteroideos; dicho efecto, facilita el control del dolor crónico, asociado a la enfermedad articular degenerativa (osteoartritis), la displasia de cadera o de codo y la enfermedad del disco intervertebral, entre otras.

Uso Veterinario.

Especies y Dosis:



Especie	Peso Corporal	Dosis Principio Activo	Dosis producto
 Caninos	2,8 kg	4,4 mg	½ tableta cada 24 horas
	5,7 kg	4,4 mg	1 tableta cada 24 horas
		2,2 mg	½ tableta cada 12 horas
11 kg	2,2 mg	1 tableta cada 12 horas	

Registro:

Ecuador Reg. No. RIP-02-FAR-00111



Administrar por 5 a 7 días o a criterio del Médico Veterinario.

Administración:

Vía oral, directamente en la boca del animal.

Advertencias y Contraindicaciones:

- Contraindicado en pacientes con trastornos hematológicos (anemia hemolítica), deshidratación, hipovolemia, hipotensión, hembras gestantes, cachorros menores de 6 semanas, hipersensibilidad al fármaco.
- Usar con precaución en animales geriátricos y en aquellos que presenten afecciones crónicas preexistentes como: Enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia renal o hepática.
- Su administración puede generar desde efectos digestivos leves, hasta daño hepático, renal o hematológico.
- De presentarse signos gastrointestinales, suspender la terapia si esto persiste por más de 1 a 2 días.
- Dosis superiores a las recomendadas, puede provocar hipoalbuminemia y melena.
- Evite su administración junto a productos que irriten el tubo gastrointestinal o con glucocorticoides, aminoglucósidos u otros AINES.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ELABORADO POR **JAMES BROWN PHARMA C.A.**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.

Quito - Ecuador

PBX: (593-2) 399-7000

MASCOTAS

www.jamesbrownpharma.com   /MascotasJB



F-01/2023