

Producto:
MAXIN

Solución Inyectable
Antinecrótico, Antiinfeccioso, Lipotrópico

FICHA TÉCNICA

Composición:

Cada 100 mL contiene:	
Factores antitóxicos del hígado	500 mg
Excipientes c.s.p.	100 mL

Presentaciones:

Frasco x 20 mL
Frasco x 100 mL



Indicaciones:

Se lo puede utilizar como tratamiento coadyuvante en:
 Intoxicaciones Endógenas: Intestinales (toxicosis), uremia, eclampsia gravídica, toxi-infecciones, toxemias.
 Intoxicaciones Exógenas: Debido a medicamentos arsenicales, arsenobenzóicas, bismútics, sulfamídicas, barbitúricas, anestésicas.
 Indispensable en el tratamiento de intoxicaciones por baños con garrapaticidas.
 Envenenamiento por fósforo, fenol, lisol, amoniacales, tetracloruro de carbono, fenilhidrazida, entre otros.
 Envenenamiento por picaduras de arañas y escorpiones o quemaduras.
 Enfermedades hepáticas: Hepatosis, cirrosis, hepatitis, ictericia, insuficiencia hepática, intoxicaciones alimenticias, convalecencia de piroplasmosis y hepatonefritis, entre otros.
 En pre o post operatorios para evitar vómitos o náuseas, causados por la anestesia.

Especies y Dosis:



Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos:
 Animales pequeños: 2 a 5 mL por vía intramuscular.
 Animales grandes: 20 a 50 mL por vía intramuscular o intravenosa.

Registro:



Ecuador Reg. No. 13A-9680-AGROCALIDAD

Aplicación:

Vía intramuscular profunda o intravenosa.

Advertencias:



Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 Venta Libre.



ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
 Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
 Quito - Ecuador
 PBX: (593-2) 399-7000
 www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario