



## INDICACIONES:

Actúa eficazmente en el tratamiento y control de infestaciones por pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. La rápida absorción del fluralaner a nivel intestinal permite la eliminación de los ectoparásitos a partir de las 4 horas posteriores a la administración del producto. Su acumulación principalmente a nivel graso y hepático, permiten una liberación permanente hacia el torrente sanguíneo, prolongando el efecto antiparasitario por aproximadamente 4 a 5 semanas.

Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

## COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene

Fluralaner	100 mg
Excipientes c.s.p.	625 mg

## ESPECIES Y DOSIS:

Cada tableta está destinada para tratar caninos mayores de 8 semanas, con un peso de entre 4.5 a 10 kg, equivalente a 10 - 22.2 mg de fluralaner/kg.

## PRESENTACIONES:

Caja x 1 Tableta Masticable  
Caja x 4 Tableta Masticable  
Sachet x 1 Tableta Masticable

## ADMINISTRACIÓN:

**Vía oral.** En todos los casos se recomiendan dosis únicas y repetir el tratamiento en base a la prevalencia de los parásitos en el lugar, la posibilidad de reinfestación o a criterio del Médico Veterinario.

## REGISTRO:

Ecuador Reg. No. RIP-02-FAR-01042

## ADVERTENCIAS:

Posee un amplio margen de seguridad y administrado en la dosis, frecuencia y vía recomendada no genera efectos adversos.

- ❖ Administrar el producto después del consumo de alimento, para mejorar la absorción de su principio activo.
- ⊘ No administrar la tableta en caninos menores de 8 semanas.
- ❖ Realizar un adecuado control de los ectoparásitos en el medio ambiente, ayudará a evitar las infestaciones y reinfestaciones masivas.
- ❖ La administración puede provocar diarrea o vómito. De presentarse vómitos dentro de las 3 horas posteriores a la administración de la tableta, volver a dosificar el producto.
- ⊘ No administrar en felinos.
- ❖ Usarse con precaución en pacientes con antecedentes convulsivos u otros trastornos neurológicos ya que pueden potenciar la aparición de estos.

**Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.**

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

ELABORADO POR  
**JAMES BROWN PHARMA C.A.**  
Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½,  
Sector El Rosal, Barrio La Libertad,  
Pífo. PBX: (593-2) 399-7000  
Quito - Ecuador  
[www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)



TABLETA  
MASTICABLE

**RAZAS  
PEQUEÑAS**  
desde **4,5 a 10 kg**



Conoce más en f @ j

Ayuda **Mascotas.ec**



[www.mascotas.ec](http://www.mascotas.ec)