

Ficha Técnica



Antiparasitario externo

INDICACIONES:

Actúa eficazmente en el tratamiento y control de infestaciones por pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. La rápida absorción del fluralaner a nivel intestinal permite la eliminación de los ectoparásitos a partir de las 4 horas posteriores a la administración del producto. Su acumulación principalmente a nivel graso y hepático, permiten una liberación permanente hacia el torrente sanguíneo, prolongando el efecto antiparasitario por aproximadamente 4 a 5 semanas.

Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Fluralaner	200 mg
Excipientes c.s.p.	1250 mg

ESPECIES Y DOSIS:

Cada tableta está destinada para tratar caninos mayores de 8 semanas, con un peso de entre 10 a 20 kg, equivalente a 10 – 20 mg de fluralaner/kg.

ADMINISTRACIÓN:

Vía oral. En todos los casos se recomiendan dosis únicas y repetir el tratamiento en base a la prevalencia de los parásitos en el lugar, la posibilidad de reinfestación o a criterio del Médico Veterinario.

ELABORADO POR
JAMES BROWN PHARMA C.A.
 Pífo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.
 PBX: +593 2 399 7000
 Quito - Ecuador
www.jamesbrownpharma.com



ADVERTENCIAS:

Posee un amplio margen de seguridad y administrado en la dosis, frecuencia y vía recomendada no genera efectos adversos.

- ✦ Administrar el producto después del consumo de alimento, para mejorar la absorción de su principio activo.
- ⊘ No administrar la tableta en caninos menores de 8 semanas.
- ✦ Realizar un adecuado control de los ectoparásitos en el medio ambiente, ayudará a evitar las infestaciones y reinfestaciones masivas.
- ✦ La administración puede provocar diarrea o vómito. De presentarse vómitos dentro de las 3 horas posteriores a la administración de la tableta, volver a dosificar el producto.
- ⊘ No administrar en felinos.
- ✦ Usarse con precaución en pacientes con antecedentes convulsivos u otros trastornos neurológicos ya que pueden potenciar la aparición de estos.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

- Caja x 1 Tableta Masticable
- Caja x 4 Tableta Masticable
- Sachet x 1 Tableta Masticable

REGISTRO:

Ecuador Reg. No. RIP-02-FAR-01044
 Guatemala MAGA No. MV-956
 Nicaragua IPSA MV-16503

**RAZAS
 MEDIANAS**
 desde **10 a 20 kg**



Conoce más en [f](#) [@](#) [d](#)
Ayuda Mascotas.ec



www.mascotas.ec