

## Ficha Técnica



### Antiparasitario externo

#### INDICACIONES:

Actúa eficazmente en el tratamiento y control de infestaciones por pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. La rápida absorción del fluralaner a nivel intestinal permite la eliminación de los ectoparásitos a partir de las 4 horas posteriores a la administración del producto. Su acumulación principalmente a nivel graso y hepático, permiten una liberación permanente hacia el torrente sanguíneo, prolongando el efecto antiparasitario por aproximadamente 12 a 15 semanas.

Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

#### COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Fluralaner	250 mg
Excipientes c.s.p.	1000 mg

#### ESPECIES Y DOSIS:

Cada tableta está destinada para tratar caninos mayores de 8 semanas, con un peso de entre 4,5 a 10 kg, equivalente a 25 – 55.5 mg de fluralaner/kg.

#### ADMINISTRACIÓN:

**Vía oral.** En todos los casos se recomiendan dosis únicas y repetir el tratamiento en base a la prevalencia de los parásitos en el lugar, la posibilidad de reinfestación o a criterio del Médico Veterinario.

ELABORADO POR  
**JAMES BROWN PHARMA C.A.**  
 Pífo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.  
 PBX: +593 2 399 7000  
 Quito - Ecuador  
[www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)



#### ADVERTENCIAS:

Posee un amplio margen de seguridad y administrado en la dosis, frecuencia y vía recomendada no genera efectos adversos.

- ⚡ Administrar el producto después del consumo de alimento, para mejorar la absorción de su principio activo.
- ⊘ No administrar la tableta en caninos menores de 8 semanas.
- ⚡ Realizar un adecuado control de los ectoparásitos en el medio ambiente, ayudará a evitar las infestaciones y reinfestaciones masivas.
- ⚡ La administración puede provocar diarrea o vómito. De presentarse vómitos dentro de las 3 horas posteriores a la administración de la tableta, volver a dosificar el producto.
- ⊘ No administrar en felinos.
- ⚡ Usarse con precaución en pacientes con antecedentes convulsivos u otros trastornos neurológicos ya que pueden potenciar la aparición de estos.

**Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.**

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIONES:

- Caja x 1 Tableta Masticable
- Sachet x 1 Tableta Masticable

#### REGISTRO:

Ecuador. Reg. No.: 3B1-18528-AGROCALIDAD

**RAZAS PEQUEÑAS**  
 desde 4,5 a 10 kg



Conoce más en f @ 🎵  
**Ayuda Mascotas.ec**



[www.mascotas.ec](http://www.mascotas.ec)