



Antiparasitario interno y externo

**Indicaciones:**

La innovadora asociación de sus componentes le confieren al producto una acción farmacológica de amplio espectro en el tratamiento y control de parasitosis internas causadas por: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Physaloptera spp, Trichuris vulpis, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Dipylidium caninum, Mesocoestoides corti, Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosus; además controla eficazmente las parasitosis externas causadas por: pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. La rápida absorción del fluralaner a nivel intestinal permite la eliminación de los ectoparásitos a partir de las 4 horas posteriores a la administración del producto. Su acumulación principalmente a nivel graso y hepático, permiten una liberación permanente hacia el torrente sanguíneo, prolongando el efecto antiparasitario por aproximadamente 4 a 5 semanas. Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum, enfermedades parasitarias transmitidas por ectoparásitos. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

**Composición:** Cada tableta contiene:

Fluralaner	200 mg
Pamoato de pirantel	180 mg
Praziquantel	90 mg
Excipientes c.s.p.	1250 mg

**Administración:**

Vía Oral.

**Advertencias:**

- ⚠ Administrar solo las dosis recomendadas.
- ⚠ No administrar la tableta en caninos menores de 8 semanas
- ⚠ Su administración puede provocar diarrea o vómito. De presentarse vómitos dentro de las 3 horas posteriores a la administración de la tableta, volver a dosificar el producto.
- ⚠ Usarse con precaución en pacientes con antecedentes convulsivos u otros trastornos neurológicos, ya pueden potenciar la aparición de estos. No administrar en felinos.
- ⚠ Administrar con cautela en animales extremadamente debilitados.

Posee un amplio margen de seguridad y administrado en la dosis, frecuencia, y vía recomendada no genera efectos adversos.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**

Venta libre.

Uso Veterinario.

**Presentación:**

- Sobre x 1 tableta
- Caja x 1 sobre
- Caja x 4 sobres

**Registros:**

Ecuador. Reg. No. RIP-02-FAR-01294  
Nicaragua IPSA MV-16526

**RAZAS MEDIANAS**  
desde 10 a 20 kg



Conoce más en f @ 🎵  
**Ayuda Mascotas.ec**

[www.mascotas.ec](http://www.mascotas.ec)