



Antiparasitario interno y externo

Indicaciones:

La innovadora asociación de sus componentes le confieren al producto una acción farmacológica de amplio espectro en el tratamiento y control de parasitosis internas causadas por: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Physaloptera spp*, *Trichuris vulpis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Dipylidium caninum*, *Mesocestoides corti*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*; además controla eficazmente las parasitosis externas causadas por: pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. La rápida absorción del fluralaner a nivel intestinal permite la eliminación de los ectoparásitos a partir de las 4 horas posteriores a la administración del producto. Su acumulación principalmente a nivel graso y hepático, permiten una liberación permanente hacia el torrente sanguíneo, prolongando el efecto antiparasitario por aproximadamente 4 a 5 semanas.

Brinda protección indirecta contra la transmisión de *Babesia canis*, *Anaplasma platys* y *Ehrlichia canis* e infestaciones de *Dipylidium caninum*, enfermedades parasitarias transmitidas por ectoparásitos. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

Composición: Cada tableta contiene:

Fluralaner	400 mg
Pamoato de pirantel	360 mg
Praziquantel	180 mg
Excipientes c.s.p.	2500 mg

Administración:

Vía Oral.

Advertencias:

- Administrar solo las dosis recomendadas.
- No administrar la tableta en caninos menores de 8 semanas
- Su administración puede provocar diarrea o vómito. De presentarse vómitos dentro de las 3 horas posteriores a la administración de la tableta, volver a dosificar el producto.
- Usarse con precaución en pacientes con antecedentes convulsivos u otros trastornos neurológicos, ya pueden potenciar la aparición de estos. No administrar en felinos.
- Administrar con cautela en animales extremadamente debilitados.

Posee un amplio margen de seguridad y administrado en la dosis, frecuencia, y vía recomendada no genera efectos adversos.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta libre.

Uso Veterinario.

Presentación:

Sobre x 1 tableta
Caja x 1 sobre
Caja x 4 sobres

Registros:

Ecuador. Reg. No. RIP-02-FAR-01293

RAZAS GRANDES
desde **20 a 40 kg**



Conoce más en f @ d

Ayuda Mascotas.ec



www.mascotas.ec