

LISTA DE PRECIOS



Salud
Animal





Salud Animal

AD3E-JB



Vitámico Solución Inyectable



Indicaciones:

Prevención y tratamiento de estados carenciales y bajos niveles de AD3E. Ideal en problemas reproductivos, crecimiento retardado, evita el raquitismo, osteomalacia y favorece el engorde.

Vía intramuscular profunda

Bovinos y Equinos: 2 a 4 mL.

Terneros y Potros: 1 a 2 mL.

Porcinos: 1 a 2 mL.

Ovinos y Caprinos: 1 a 2 mL.

En animales de engorde o cría puede repetirse cada 2 a 3 meses.

Cada mL contiene:

Vitamina A 500.000 UI

Vitamina D3 75.000 UI

Vitamina E 50 UI

Frasco 20 mL 7,65

Caja disp. x 20 frascos

Frasco 100 mL 31,20

Frasco 250 mL 73,75

Frasco 500 mL 133,50

AD3E SOLUBLE



Vitámico Polvo Soluble



Indicaciones:

Utilizado para estimular la resistencia, vitalidad, procesos reproductivos y retraso en el desarrollo. Adyuvante en los tratamientos digestivos y antiparasitarios. En aves favorece la fertilidad, eclosión y resistencia de la cáscara de huevo. Evita el raquitismo, osteomalacia y estrés.

Vía oral.

Disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Bovinos, Equinos y Porcinos: 20 g disuelto en 40 litros de agua.

Aves: 2 g disuelto en 4 litros de agua.

100 g mezclado en 500 kg de alimento.

Cada 100 g contiene:

Vitamina A 1000.000 UI

Vitamina D3 200.000 UI

Vitamina E 175 UI

Vitamina C 1.000 mg

Sobre 20 g 0,95

Caja disp. x 50 sobres

AMINO-VIT INY.



Reconstituyente Solución Inyectable



Indicaciones:

Para el tratamiento de la deshidratación y desequilibrio fisiológico ocasionado por diarreas persistentes, hemorragias, vómito, afecciones del rumen y del aparato digestivo, agotamiento por calor, estados de shock y estrés.

Vía intravenosa, intramuscular, intraperitoneal o subcutánea.

Animales adultos: 1 mL por cada kg de peso.

Animales jóvenes, perros y gatos: 2 mL por cada kg de peso. Repetir el tratamiento por 3 a 4 días.

Cada 100 mL contiene:

B2 11 mg; B12 10 ug; B6 20 mg; B1 20 mg; B3 225 mg. Aminoácidos: Histidina 1 mg; Metionina 1 mg; Triptófano 1 mg; Cisteína 1 mg; Treonina 2 mg; Isoleucina 2 mg; Arginina 2,4 mg; Fenilalanina 3 mg; Valina 5 mg; Lisina 3 mg; Leucina 4 mg; Glutamato de Sodio 4 mg. Minerales: Cloruro de Calcio 15 mg; Cloruro de Potasio 20 mg; Sulfato de Magnesio 27,3 mg; Acetato de Sodio 150 mg; Dextrosa 5 g.

Frasco 100 mL 4,55

Frasco 500 mL 13,75

AMINO-VIT ORAL



Reconstituyente - Solución Oral



Indicaciones:

Esencial para tratamientos de desequilibrio fisiológico ocasionados por deshidrataciones, diarreas persistentes, hemorragias, vómito, agotamiento por calor, estrés de trabajo y ejercicios prolongados.

Vía oral

Bovinos y Equinos: 450 mL por 2 días.

Terneros, Potros, Porcinos y Ovinos: 50 a 200 mL por 3 días.

Aves: 20 mL por litro de agua.

Cada mL contiene:

Vitaminas: B2 0,04 mg; B12 0,05 ug; B6 0,1 mg; B3 1,5 mg; B1 0,1 mg; B5 0,05 mg. Aminoácidos: Histidina 0,6 mg; Metionina 0,6 mg; Triptófano 0,6 mg; Cisteína 0,5 mg; Treonina 0,8 mg; Isoleucina 0,85 mg; Arginina 0,85 mg; Fenilalanina 1,02 mg; Valina 1,4 mg; Lisina 1,7 mg; Leucina 1,36 mg; Sodio glutamato 1,36 mg. Minerales: Calcio 0,4 mg; Potasio 1,0 mg; Magnesio 0,2 mg; Sodio 0,5 mg; Dextrosa 50 mg.

Frasco 450 mL 12,95

AMOXIFLOX



Antibiótico de amplio espectro Polvo Soluble



Indicaciones:

Ideal en el tratamiento y control de infecciones del tracto urinario, respiratorio y de tejidos blandos en aves y porcinos.

Vía oral

Disolver Amoxiciflox en agua y proporcionar como única fuente de bebida. 6.5 g en 10 litros de agua.

Cada 24 horas por 3 a 5 días.

Cada kg contiene:

Amoxicilina Trihidratada 200 g

Ciprofloxacina HCl 200 g

Sobre 100 g 9,15

Funda 1 kg 57,00

AZITRO-VET



Antibiótico de amplio espectro Solución Oral



Indicaciones:

Antibiótico macrólido sintético de amplio espectro, útil en el tratamiento y control de microorganismos Gram positivos y Gram negativos; causantes de infecciones del tracto respiratorio y digestivo en aves y caninos.

Vía oral

Aves: 1 mL por litro de agua.

Caninos y felinos: 0.5 a 1.5 mL/10 kg de peso vivo.

Cada Litro contiene:

Azitromicina Dihidrato 100 g

Gotero 30 mL 5,60

Frasco 1 lt 110,75

BENDACUR Granulado



Antiparasitario interno Granulado al 22%



Indicaciones:

Para el control de nematodos gastrointestinales, pulmonares y cestodos.

Vía oral

Granulado al 22%
Bovinos, Ovinos y Porcinos: 1 sobre por 440 kg de peso.
Equinos: 1 sobre por 300 kg de peso.

Cada 10 g contiene:

Fenbendazol 2,2 g

Sobre 10 g 1,80

Caja disp. x 50 sobres

BENDACUR JB



Antiparasitario interno Suspensión Oral



Indicaciones:

Antiparasitario interno indicado para el control de nematodos gastrointestinales, pulmonares y cestodos.

Vía oral

Suspensión al 10%
Bovinos, Ovinos y Porcinos: 5 mL por 100 kg de peso.
Equinos: 8 mL por 100 kg de peso.

Cada 100 mL contiene:

Fenbendazol 10 g

Bolo 15 mL 1,75

Caja disp. x 50 bolos

Jeringa 30 mL 5,35

Frasco 100 mL 5,80

Frasco 500 mL 26,78

Combo

BENDACUR + B-PLEX

Bendacur Fco x 1000 mL + B-Plex Fco x 100 mL .. 43,50

B-PLEX



Vitaminas Complejo B Solución Inyectable



Indicaciones:

Indicado en el tratamiento de deficiencias de vitaminas del complejo B en los estados anémicos, baja condición corporal por enfermedades extenuantes, diarreas, trastornos metabólicos, neuritis y afecciones cutáneas. Aduvante en tratamientos de antibióticos y quimioterápicos.

Vía intramuscular e intravenosa lenta

Bovinos y Equinos: 15 a 20 mL.
Porcinos: 5 a 10 mL.
Terneros y Potros: 5 a 10 mL.
Ovinos y Caprinos: 2 a 5 mL.
Caninos: 2 a 5 mL. Gatos: 1 a 2 mL.
Repetir cada 24 horas de 3 a 5 días.

Cada mL contiene:

Vitaminas: B1 10 mg; B2 4 mg;
B5 5 mg; B6 4 mg; B12 0,05 mg;
B3 60 mg; B7 0,1 mg.

Frasco 10 mL 2,50

Caja disp. x 40 frascos

Frasco 20 mL 3,55

Caja disp. x 20 frascos

Frasco 100 mL 8,90

Frasco 250 mL 18,30

BENZAPEN L.A.



Antibiótico + antiinflamatorio no esteroideo Suspensión Inyectable



Indicaciones:

Tratamiento de neumonías, septicemias, carbón sintomático, panadizos, leptospirosis, difteria y mastitis causadas por bacterias Gram positivas y negativas. Flunixin es antipirético, analgésico y antiinflamatorio.

Vía intramuscular

Bovinos y Equinos: 1 mL por 20 kg de peso.
Porcinos y Ovinos: 1 mL por 20 kg de peso.
Caninos: 1 mL por 10 kg de peso.
Repetir el tratamiento después de 48 horas.

Cada mL contiene:

Penicilina G. Benzatínica. 100.000 UI
Penicilina G. Procaínica... 100.000 UI
Dihidroestreptomicina 200 mg
Flunixin Meglumine 15 mg

Frasco 10 mL 4,80

Caja disp. x 40 frascos

Frasco 50 mL 16,15

Frasco 100 mL 28,25

BIO-EQUS



Probiótico Pasta Oral



Indicaciones:

Aumenta la digestibilidad y absorción de nutrientes, fortaleciendo las funciones intestinales. Disminuye la acumulación de ácido láctico. Reduce trastornos digestivos (cólicos y laminitis). Favorece el bienestar y la vitalidad del caballo, mejorando así su aspecto y condición corporal.

Vía oral

Equinos Adultos: 5 g diariamente mínimo por 3 meses, o a criterio del Médico Veterinario.

Cada g contiene:

Saccharomyces cerevisiae UFC 1x10⁷ (unidades formadoras de colonias)

Jeringa 60 g 11,90

BRONCO-MAX



Antibiótico, mucolítico y expectorante Suspensión Inyectable



Indicaciones:

Combate la neumonía, bronconeumonía, neumo-enteritis, difteria y otras enfermedades respiratorias.

Vía Intramuscular (I.M.) profunda

De 3 a 6 mL por cada 45 kg (100 lbs) de peso vivo.

Cada vial contiene:

Penicilina G Sódica 300.000 UI
Penicilina G Procaínica 900.000 UI
Estreptomicina base Sulfato 1.5 g
Diluyente: Bromhexina HCl 3 mg

Frasco 10 mL 4,35

BRON TIL



Antibiótico Solución Oral



Indicaciones:

Eficaz en el control y tratamiento de enfermedades respiratorias en aves y porcinos.

Vía oral

Aves 0.3 mL X 1 litro de agua.
Porcinos 1 mL X 1 litro de agua.
Repetir cada 24 horas por 5 días.

Cada mL contiene:

Tilmicosina fosfato 250 mg

Frasco 250 mL 45,00

BROWNI-VIT



Multivitámico Suspensión en cápsulas



Indicaciones:

Para mantener los procesos orgánicos normales de salud, desarrollo, fertilidad y producción. Cubre necesidades fisiológicas evitando carencias vitamínicas, raquitismo y debilidad. Mejora la condición corporal.

Vía oral

Terneros y Potros: 1 cápsula el primer día.
Vacas: 2 cápsulas 15 días antes del servicio.
Yeguas y Reproductores: 2 cápsulas 15 días antes de la monta.
Lechones: 1 cápsula al inicio del engorde.
Cerdas: 2 cápsulas antes del servicio

Cada cápsula contiene:

Vitaminas: A 2.000.000 U.I.; D3 10.000 U.I.; E 600 U.I.; B1 9 mg; B2 20 mg; B6 9 mg; B12 0,125 mg; B8 0,3 mg; B3 37,5 mg; C 500 mg; Pantotenato de Calcio 15 mg.

Caja x 24 bolos 81,60

En blister + 4 bolos

Caja x 50 bolos ... 170,00

En blister + 10 bolos

CALCIFORT



Reconstituyente mineral Solución Inyectable



Indicaciones:

Para el tratamiento de las hipocalcémias, fiebre de leche después del parto. En la terapia de varios desórdenes metabólicos, como toxemia de la preñez, tetania de los pastos, osteoporosis, raquitismo, intoxicaciones de varios orígenes, síntomas neuromusculares por carencia de calcio, fósforo o magnesio.

Vía intravenosa lenta.

Bovinos y Equinos: 1 mL por kg de peso.

Vía subcutánea.

Porcinos: 1 mL por Kg de peso.
En casos necesarios repetir de acuerdo a la indicación profesional.

Cada mL contiene:

Cloruro de magnesio 83,50 mg
Hipofosfito de calcio 29,00 mg
Gluconato de calcio 151,50 mg
Dextrosa anhidra 160,00 mg
Excipientes c.s.p. 1 mL

Frasco 500 mL 19,50

Combo

CALCIFORT + B-PLEX

2 Calcifort Fco x 500 mL +
B-Plex Fco x 100 mL 39,00

CALCIFORT ORAL



Reconstituyente Mineral Solución Oral



Indicaciones:

Aumenta las concentraciones de calcio en la sangre, eficaz en el tratamiento de la hipocalcemia subclínica.

Vía oral.

Directamente en la boca del animal.
Vacas: Un frasco al momento del parto y un frasco 12 horas posterior al parto.

Cada 500 mL contiene:

Hipofosfito de calcio 27,76 g
Propionato de calcio 64,32 g
Cloruro de Magnesio 83,63 g
Dextrosa 88,00 g

Producto
NUEVO

Frasco 500 mL 15,95

CEFASPUR



Antibiótico de amplio espectro Suspensión Inyectable



Indicaciones:

Cefalosporina de tercera generación, **no deja residuos en la leche**. Para el tratamiento de neumonías, enfermedades respiratorias, panadizos, salmonelosis, mastitis y colibacilosis.

Vía intramuscular profunda

Bovinos: 1 a 2 mL por 50 kg.
Porcinos: 1 mL por 15 kg.
Equinos: 2 a 4 mL por 50 kg.
Repetir cada 24 horas de 3 a 5 días.
Caninos: vía subcutánea 0.2 mL por 5 kg.

Cada mL contiene:

Ceftiofur Clorhidrato 50 mg

Frasco 20 mL 7,95

Frasco 100 mL 34,90

CELO FIJO



Compuesto Hormonal Solución Inyectable



Indicaciones:

En todos los desórdenes del sistema reproductor femenino, tanto en la infertilidad temporal como permanente.

Vía intramuscular o subcutánea.

Vacas y yeguas: 5 mL.
Cerdas, ovejas y cabras: 2 a 4 mL.
Perras: 0.5 a 1 mL

Cada 5 mL contiene:

Benzoato de Estradiol 12,5 mg
Vitamina A 50.000 U.I.
Vitamina E 100 U.I.

Frasco 10 mL 3,95

DERRIBANTE



Garrapaticida y Mosquicida Solución para uso externo



Indicaciones:

Altamente eficaz en el tratamiento y control de garrapatas y otros parásitos externos de los animales. La combinación de un pesticida organofosforado y un piretroide tiene efecto sinérgico contra cepas de garrapatas resistentes a otros pesticidas. Acción residual más prolongada.

Para baños de aspersión.

Disolver 1 mL de producto en 1 litro de agua.

Para baños de inmersión.

Disolver 1 litro de producto por cada 1000 litros de agua.

Cada 100 mL contiene:

Cipermetrina High Cis 10 g
Ethion 40 g

Frasco 20 mL 3,25

Caja disp. x 20 frascos

Frasco 100 mL 9,50

Frasco 500 mL 42,50

Frasco 1 lt 78,50

DEXTROSA AL 50%



Energizante y Desintoxicante Solución Inyectable



Indicaciones:

Fuente de dextrosa, como energético en los casos de cetosis, en intoxicaciones usar asociada a hepato protectores. Aduvante en el control de edemas de origen circulatorio.

Vía intravenosa, subcutánea o intraperitoneal.

Bovinos y Equinos: 100 a 500 mL.
Ovinos y Porcinos: 30 a 100 mL.
Repetir de 3 a 5 veces según sea los casos.

Cada mL contiene:

Dextrosa Monohidratada. 500 mg

Frasco 500 mL 9,20

DOMAX



Antiparasitario interno y externo Solución Inyectable



Indicaciones:

Para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares. Ectoparásitos como garrapatas, ácaros, piojos, larvas de insectos (nuche, gusaneras superficiales y cavitarias).

Vía subcutánea

En el pliegue del cuello o tras la escápula
Bovinos y Ovinos: 1 mL por 50 kg de peso.
Porcinos: 1 mL por 33 kg de peso.

Cada mL contiene:

Doramectina..... 10 mg

Frasco 10 mL 3,95
Frasco 50 mL 14,35
Frasco 100 mL 25,85
Frasco 500 mL 107,00

Combo

DOMAX

Domax x 500 mL + Domax
x 100 mL..... 107,00

ELECTRAVITE



Reconstituyente Polvo Soluble



Indicaciones:

Utilizado en la deshidratación, anorexia, diarreas, secuelas de alteraciones metabólicas que causan deficiencias en la condición corporal. Aduvante en casos de estrés y baja de producción.

Vía oral

Disuelto en el agua de bebida.
Bovinos, Equinos, Porcinos, Caninos y Aves:
Disolver 1 g por litro de agua.
Permitir que el animal consuma todo lo que desee.

Cada 100 g contiene:

Vitaminas: A 220.000 UI; D3 110.000 UI;
E 200 UI; K 100 mg; B2 220 mg; B6 90
mg; C 250 mg; B1 90 mg; B12 0,5 mg; B3
2.000 mg; B9 125 mg; B5 550 mg; B8 2
mg. Aminoácido: Metionina 5.000 mg.
Minerales: Cloruro de Potasio 6 g;
Cloruro de Sodio 20 g; Citrato de Sodio
12 g.

Sobre 20 g 0,95

Caja disp. x 50 sobres

Pomo 100 g 4,20

Sobre 1 kg..... 28,50

ENROBAC



Antibiótico de amplio espectro Solución Oral



Indicaciones:

Para el control y tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas en aves y caninos.

Vía oral

Aves: Vía oral en el agua de bebida 0.5 ml por litro de agua. Gotero: 1 gota pollos de 15 días, 2 gotas pollos de 30 días, 3 a 4 gotas aves adultas. Cada gota equivale a 5 mg de Enrofloxacin. Caninos: 1 mL por 10 kg. Tratar entre 3 a 5 días.

Cada mL contiene:

Enrofloxacin..... 100 mg

Gotero 10 mL 2,10

Caja x 24 goteros

FERRO 100



Antianémico Solución Inyectable



Indicaciones:

Para el tratamiento y prevención de la anemia de los lechones recién nacidos. Reduce la mortalidad de las camadas. En otras especies corrige las anemias post hemorrágicas y hemolíticas. Estimulante de las defensas. Mejora el desarrollo y aumenta el peso.

Vía intramuscular

Lechones: 1 a 2 mL.
Terberos y Potros: 4 mL.
Bovinos y Equinos: 4 a 8 mL.

Cada mL contiene:

Hierro Dextrano 100 mg
Vitamina B12..... 1 mg

Frasco 10 mL 2,65

Caja x 40 frascos

Frasco 20 mL 3,25

Frasco 100 mL 9,50

FERRO 200



Antianémico Solución Inyectable



Indicaciones:

Utilizar para el tratamiento y prevención de la anemia de los lechones recién nacidos. Reduce la mortalidad de las camadas. En otras especies corrige las anemias post hemorrágicas y hemolíticas. Estimulante de las defensas. Mejora el desarrollo y aumenta el peso.

Vía intramuscular

Lechones: 0.5 a 1 mL.
Bovinos: 2.5 a 5 mL.

Cada mL contiene:

Hierro Dextrano 200 mg
Vitamina B12..... 2 mg

Frasco 100 mL 16,25

Frasco 250 mL 34,50

FIPROMEK



Antiparasitario interno y externo Solución Tópica



Indicaciones:

Está destinado para usar en bovinos de carne, su fórmula actúa controlando tanto parásitos internos: nematodos gastrointestinales y pulmonares, como parásitos externos: nuche, miasis, mosca del cuerno, garrapatas y piojos.

Tópica, a lo largo de la línea dorsal.

Bovinos de carne: 1 mL/10 kg de peso vivo.

Cada mL contiene:

Fipronil..... 10 mg
Ivermectina..... 5 mg

Frasco 250 mL ... 19,80

Frasco 1000 mL ... 59,00

Garrafa 5 L. 235,00

FLORFENICOL



Antibiótico de amplio espectro Solución Oral



Indicaciones:

Útil en el tratamiento de infecciones en vías respiratorias, digestivas y genitourinarias.

Vía oral.

Dosis terapéutica 20 mg/kg de peso vivo, se recomienda administrar 1 mL de Florfenicol/1 litro de agua de bebida. Repetir durante 2 a 4 días en aves y 5 días en porcinos.

Cada mL contiene:

Florfenicol..... 100 mg

Gotero 30 mL 4,00

Frasco 1 lt..... 45,00

FLUMEZONA



Antiinflamatorio Solución Inyectable



Indicaciones:

Efectos duraderos en afecciones inflamatorias, reacciones alérgicas, cetosis, traumatismos, músculo esquelético y articulares. No utilice en hembras gestantes en tratamientos prolongados.

Vía intramuscular profunda.

Bovinos: 2.5 a 10 mL.
Equinos: 2.5 a 5 mL.
Ovinos y Caprinos: 1 a 2 mL.
Porcinos: 0.25 a 5 mL.
Caninos: 0.12 a 1 mL.

Cada mL contiene:

Flumetasona..... 0,5 mg

Frasco 10 mL 4,35

Caja x 40 frascos

Frasco 50 mL 14,80

FLUNIXIN



Antiinflamatorio, Analgésico y Antipirético Solución Inyectable



Indicaciones:

Destinado para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos, osteomusculares, mastitis, metritis, agalactia. Control de la pirexia y dolor quirúrgico.

Vía intravenosa e intramuscular

Equinos: (Caballos, burros y mulas): 1 mL/45 kg, cada 24 horas por 1 a 5 días.
Bovinos y porcinos: 2 mL/45 kg, cada 24 horas por 1 a 3 días.
Caninos 0.5 mL/ 25 kg cada 24 horas por 1 a 3 días.

Cada mL contiene:

Flunixin meglumine.....50 mg

Frasco 20 mL 6,95

Frasco 50 mL 13,75

Frasco 100 mL 22,65

FLUVIPEN



Antibiótico + Antiinflamatorio esteroideo Suspensión Inyectable



Indicaciones:

Ideal en procesos de neumonía, metritis, septicemia, leptospirosis, carbón sintomático y heridas traumáticas.

Vía intramuscular profunda.

Bovinos y Equinos: 1 mL por 20 kg de peso.
Porcinos y Ovinos: 1 mL por 15 kg de peso.
Caninos: 1 a 2 mL por 5 kg de peso.
Felinos: 0.5 a 1 mL por 5 kg de peso.
Repetir durante 3 a 5 días.

Cada mL reconstituido contiene:

Penicilina G.Procaínica ..200,000 UI
Dihidroestreptomicina 300 mg
Flumetasona..... 0,065 mg

Frasco 20 mL 9,35

FÓRMULA 62



Larvicida, Cicatrizante y Repelente Pasta Tópica



Indicaciones:

Para la aplicación en heridas infestadas por larvas de gusano barrenador. Por su acción repelente evita las reinfestaciones. Indicado en tratamientos de heridas accidentales o quirúrgicas, gusaneras, ombligos de recién nacidos.

Tópico.

Colocar directamente en la herida y superficie contigua. Repetir el tratamiento cuantas veces sean necesarias.

Cada 100 g contiene:

Difenilamina 35 g
Negro de humo 20 g
Tolueno 35 g

Frasco 200 g 11,75

Con aplicador

FORTIPEN



Antibiótico + Antiinflamatorio no esteroideo Suspensión Inyectable



Indicaciones:

Eficaz en las neumonías, mastitis, pododermatitis, septicemia, leptospirosis e intervenciones quirúrgicas.

Vía intramuscular profunda.

Dosis: 1 mL por cada 20 kg de peso.
Bovinos y Equinos: 20 mL.
Novillos y Potros: 10 mL.
Terberos, Ovejas, Porcinos: 3 a 8 mL.
Repetir cada 12 horas por 5 días.

Cada mL reconstituido contiene:

Penicilina G.Sódica 150.000 UI
Penicilina G.Procaínica 150.000 UI
Estreptomicina 300 mg
Diclofenaco Sódico 15 mg

Frasco 20 mL 8,75

FOSFOPLEX



Reconstituyente Solución Inyectable



Indicaciones:

Para la prevención y tratamiento de trastornos metabólicos y reproductivos. Previene casos de infertilidad, calores ausentes y nacimientos de terneros débiles, acorta el intervalo entre partos, aumenta la tasa de concepción. En machos mejora la producción y calidad de semen.

Vía intramuscular profunda.

Bovinos y Equinos: 20 mL
Ovinos y Porcinos: 5 a 10 mL
Repetir durante 3 días.

Cada mL contiene:

Vitaminas: B1 3,33 mg; B2 1,33 mg; B6 0,66 mg; B12 0,05 mg; B8 0,03 mg; B3 20 mg, Pantenol 1,66 mg.
Minerales: Glicerofosfato de Calcio 13,30 mg; Glicerofosfato de Hierro 20,00 mg; Glicerofosfato de Magnesio 26,66 mg; Hierro Dextrán 37,78 mg; Arseniato de Sodio 0,99 mg; Selenio de Sodio 0,21 mg.

Frasco 20 mL 4,95

Frasco 100 mL 12,85

Frasco 500 mL 41,90

FOSFORTE



Reconstituyente Mineral Solución Inyectable



Indicaciones:

Regulador del metabolismo de minerales en el organismo, en animales débiles y desnutridos. Aduvante en los problemas reproductivos y trastornos orgánicos por deficiencia de calcio, fósforo y otros minerales.

Vía intramuscular o subcutánea.

Bovinos y Equinos: 10 a 20 mL.
Porcinos y Ovinos: 5 a 10 mL.
Caninos: 3 a 5 mL.
Repetir durante 3 días o de acuerdo al criterio profesional.

Cada mL contiene:

Glicerofosfato de Hierro 40 mg
Glicerofosfato de Magnesio 40 mg
Glicerofosfato de Calcio 20 mg
Arseniato de Sodio 3 mg

Frasco 20 mL 4,55

Caja x 20 frascos

Frasco 100 mL 12,50

Frasco 250 mL 24,10

GALLIMICINA



**Antibiótico
Polvo Granulado**



Indicaciones:

Enfermedad crónica respiratoria, coriza infecciosa, sinovitis, estreptococosis, cólera aviar, en periodos de crecimiento o producción. También puede usarse como profiláctico de enfermedades infecciosas durante el periodo de recepción de las aves recién nacidas.

Vía oral, disuelto en el agua de bebida.

1 gramo por cada litro de agua de bebida, cada 24 horas por 3 a 7 días.

Cada g contiene:

Eritromicina tiocianato .. 110 mg

Sobre 10 g **0,95**

Caja disp. x 50 sobres

GANADOR



**Reconstituyente
Solución Oral**



Indicaciones:

Para el control del estrés generado en situaciones de manejo, alta producción, ambientes adversos, trabajo intenso, favorece la recuperación de animales convalecientes, corrige estados carenciales y desequilibrios nutricionales. En apicultura está recomendado para incrementar la población de la colmena, mejorando su producción.

Vía oral.

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos: 1 a 2 mL por cada 10 kg de peso, disuelto en el agua de bebida o directamente en la boca del animal.

Aves, conejos y cuyes: 1 a 2 mL por litro de agua de bebida, Cada 24 horas, por 5 días consecutivos.

Abejas: 5 mL de producto disuelto en una solución de sacarosa al 100%, en cada colmena.

Cada mL contiene:

Vitaminas: A 1.650 UI; D3 20.000 UI; C 0,12 mg; B1 1,75 mg; B2 2,50 mg; B3 16,25 mg; B5 7,50 mg; B6 1,25 mg; B8 0,01 mg; B12 0,0014 mg. Aminoácidos: Arginina 6,10 mg; Cisteína 2,10 mg; Fenilalanina 3,00 mg; Histidina 3,00 mg; Isoleucina 6,00 mg; Leucina 8,70 mg; Lisina 9,50 mg; Metionina 2,20 mg; Treonina 5,00 mg; Triptófano 2,00 mg; Valina 6,20 mg. Minerales: Citrato de sodio 0,30 mg; Cloruro de potasio 0,30 mg; Cloruro de sodio 0,50 mg.

Gotero 30 mL.....**2,30**

Frasco 150 mL**7,90**

Frasco 1000 mL**38,00**

Galón**123,50**

Caneca.....**485,00**

GARRAKILL



**Garrapaticida y Mosquicida
Solución de uso externo**



Indicaciones:

Para el control de garrapatas e insectos de los animales e instalaciones pecuarias. Los piretroides actúan mejor en aguas de buena calidad, controlando cepas de ectoparásitos resistentes a ciertos plaguicidas.

Para baños de aspersión.

Disolver 1 mL de producto en 1 litro de agua.

Para baños de inmersión.

Disolver 1 litro de producto por cada 1000 litros de agua.

Cada 100 mL contiene:

Cipermetrina 20 g

Frasco 20 mL **2,85**

Caja x 20 frascos

Frasco 100 mL **7,50**

IVEQUIN



**Antiparasitario interno y externo
Gel Oral**



Indicaciones:

Para el control de infestaciones por nematodos gastrointestinales y pulmonares, cestodos y ectoparásitos de los equinos.

Vía oral.

Gradúe el dosificador de acuerdo al peso estimado del caballo.
5 g - 100 kg de peso.
30 g - 600 kg de peso.

Cada g contiene:

Ivermectina.....12 mg
Praziquantel30 mg

Jeringa 30 g **9,80**

Frasco 240 g **49,90**

IVERMEC - JB



**Antiparasitario interno y externo
Solución Inyectable**



Indicaciones:

Para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares. Ectoparásitos: ácaros de la sarna, piojos, moscas y gusaneras. Adyuvante en el control de garrapatas, actúa inhibiendo la ovoposición y eclosión de los huevos.

Vía subcutánea en el pliegue del cuello o tras la escápula.

Bovinos, Ovinos y Camélidos: 1 mL por 50 kg de peso.
Porcinos: 1 mL por 33 kg de peso.
No aplicar en vacas en producción láctea.

Cada mL contiene:

Ivermectina.....10 mg

Frasco 10 mL **2,60**

Frasco 50 mL **6,75**

Frasco 100 mL **10,90**

Frasco 500 mL **42,00**

Combo

IVERMEC JB

Fco x 500 mL +

Fco x 100 mL **42,00**

LEVA - PLUS



**Antiparasitario Interno
Solución Inyectable**



Indicaciones:

Para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares. Cubre deficiencias de vitaminas del complejo B.

Vía intramuscular o subcutánea.

Bovinos, Ovinos y Porcinos: 5 mg/kg.
Equivalente a 1 mL por cada 30 kg de peso.

Cada mL contiene:

Levamisol HCl.....120 mg
Vitamina B120,01 mg
Vitamina B25,3 mg
Vitamina B64,2 mg

Frasco 20 mL **4,10**

Frasco 100 mL **11,50**

Frasco 500 mL **42,00**

MATAGUSANOS CURA HERIDAS



Repelente, Insecticida, Larvicida, Cicatrizante
Solución Spray



Indicaciones:

Su efectiva acción repelente e insecticida, ayuda a prevenir y controlar las gusaneras e infecciones, que pueden presentarse en heridas accidentales o quirúrgicas.

Tópico.

Rociar la herida y superficies adyacentes procurando cubrir el área afectada. Se recomienda aplicar el producto hasta la recuperación del animal.

Cada mL contiene:

Cipermetrina 10.53 mg
Diazinón 6.97 mg

Spray 100 mL 4,20

Caja x 160 spray

Spray 235 mL 6,20

Caja x 56 spray

Spray 500 mL 11,30

Caja x 35 spray

MAXIN



Antinecrótico, Hepatoprotector, Lipotrópico
Solución Inyectable



Indicaciones:

Intoxicaciones endógenas, exógenas accidentales, envenenamiento por fósforo, fenol, lisol, amoniacales, picadura y mordedura de arañas y escorpiones, enfermedades hepáticas.

Vía intramuscular o intravenosa.

Animales pequeños: 2 a 5 mL.
Animales grandes: 20 a 50 mL.

Cada 100 mL contiene:

Factores antitóxicos
de hígado 500 mg

Frasco 20 mL 3,25

Frasco 100 mL 10,70

METRIGEN



Antibiótico de amplio espectro
Suspensión Intrauterina



Indicaciones:

Cefalosporina de tercera generación, para el tratamiento de infecciones uterinas por metritis, piometras y retenciones placentarias.

Usar vía intrauterina mediante cateterismo.

En caso de ser necesario repetir el lavado a las 48 horas. Incluye catéter y guante desechable.

Cada 20 mL contiene:

Ceftiofur Clorhidrato 500 mg

Jeringa 20 mL 10,45

Caja disp. x 56 Jeringas

OXITER 200 L.A.



Antibiótico L.A. + antiinflamatorio
Solución Inyectable



Indicaciones:

Eficaz en los tratamientos de neumonías, colibacilosis, pasteurelisis, pododermatitis, salmonelosis, anaplasmosis y metritis.

Vía intramuscular

Bovinos y Equinos: 1 mL por 10 kg de peso.
Porcinos: 0,5 a 1 mL por cada 10 kg de peso. Lavados uterinos diluido en agua destilada
relación 1:2. Repetir el tratamiento a las 48 horas.

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina 226,5 mg
Flunixin Meglumine 10,0 mg

Frasco 20 mL 5,20

Frasco 100 mL 15,00

Frasco 250 mL 36,90

PANADINE



Suplemento Mineral
Polvo Soluble



Indicaciones:

Suplemento a base de yodo orgánico y cloruro de sodio para la prevención de bocio por carencias de yodo. Adyuvante en la pododermatitis, panadizo, actinomicosis y actinobacilosis.

Vía oral

Diluido en agua, mezclado en alimento o sales minerales. Bovinos, Equinos y Porcinos: 25 g por kg de sal mineral. 6 g en 10 litros de agua. 3 kg por 1.000 kg de alimento balanceado.

Cada 100 g contiene:

Etilen diamino dihidro yoduro... 4.7 g
Cloruro de Sodio 95.3 g

Sobre 500 g 13,90

PIPERAZINA 53%



Antiparasitario interno
Granulado Soluble



Indicaciones:

Para el control de parásitos redondos, nodulares y áscaris de las aves, cerdos y otras especies animales, incluidos conejos y cobayos.

Vía oral

Disuelto en el agua de bebida o mezclado en el alimento.
Aves: 10 g por 10 litros de agua. (alcanza para: 60 aves menores a 6 semanas o 30 aves mayores a 6 semanas). Porcinos: 10 g por cada kg de alimento. Cobayos y Conejos: 1 sobre de 10 g en 1 kg de alimento.

Cada 100 g contiene:

Dihidrocloruro de Piperazina
Monohidratada 53 g

Sobre 10 g 0,80

Caja disp. x 50 Sobres

PIROBENZ PLUS



Antihelminticida
Solución Inyectable



Indicaciones:

Para el tratamiento de piroplasmosis, anaplasmosis, tripanosomiasis y teileriasis, transmitidos por garrapatas e insectos. En bovinos, equinos y caninos adyuvante en el tratamiento de papilomatosis.

Vía intramuscular

3.5 mg/kg. Equivalente a 1 mL por cada 10 kg de peso.
Equinos: divide la dosis en dos partes y aplique con intervalos de 3 horas.
En casos necesarios repetir las dosis a las 24 horas.

Cada mL contiene:

Diaceturato dibenzamidina 40 mg
Oxitetraciclina base 100 mg
Antipirina 110 mg

Frasco 50 mL 13,90

Frasco 100 mL 21,90

POLYMAST AZUL

Antimastítico/Secado
Suspensión Intramamaria



Indicaciones:

Para la prevención de la mastitis en el período seco.

Después del vaciado completo de la leche.

Aplicar una jeringa por cada cuarto una sola vez.

Cada 10 mL contiene:

Sulfato de Neomicina.. 100 mg
Gramicidina 2 mg
Polimixina B..... 18 mg

Jeringa 10 mL.....2,95

Caja x 24 jeringas

Balde x 48 139,20

POLYMAST ROJO

Antimastítico
Suspensión Intramamaria



Indicaciones:

Para tratamiento de la mastitis subclínica y aguda causada por diferentes agentes bacterianos, durante el periodo de lactancia.

Después del vaciado completo de la leche.

Aplicar una jeringa por cada cuarto afectado cada 12 horas por 3 días.

Cada 10 mL contiene:

Sulfato de Neomicina.. 100 mg
Gramicidina 2 mg
Polimixina B..... 18 mg
Flumetasona..... 1 mg

Jeringa 10 mL.....2,95

Caja x 24 jeringas

Balde x 48 139,20

POST-PART

Hormona
Solución Inyectable



Indicaciones:

Provoca contracciones uterinas en el momento del parto. Estimula la bajada de la leche en vacas y cerdas. Adyuvante en las retenciones placentarias, metritis e inercia uterina.

Vía intramuscular, subcutánea e intravenosa.

Vacas y Yeguas: 2 - 5 mL.
Cerdas: 1 a 2.5 mL.
Ferras, Ovejas y Cabras: 0.25 a 1 mL.
Gatas: 0.1 a 0.2 mL.

Cada mL contiene:

Oxitocina..... 20 UI

Frasco 10 mL2,35

Frasco 50 mL7,10

Frasco 100 mL10,85

Frasco 250 mL19,55

RATIFIN

Rodenticida
Polvo granulado



Indicaciones:

Efectivo veneno para el control de ratas y ratones, produce hemorragia causando la muerte, evita la descomposición y mal olor de los roedores muertos. Evite que ratifin sea ingerido por animales y aves domésticas.

Vía oral

En cantidades suficientes para cada cebo de acuerdo a la estimación de roedores. Si los roedores consumen el producto, coloque más cantidad en los envases como cebos junto a las madrigueras.

Cada 25 g contiene:

Warfarina37.5 mg

Sobre 25 g0,99

Balde x 60 sobres

Funda 1 kg22,90

RESPICLEAN

Mucolítico y Expectorante
Solución oral



Indicaciones:

Terapia de apoyo en el tratamiento y control de enfermedades respiratorias en las cuales existe producción excesiva de moco.

Vía oral.

Agua de Bebida: Aves: 0.25 - 0.50 mL/litro de agua, Bovinos y equinos: 20 a 25 mL/animal. Terneros y potros: 6 a 7,5 mL/animal, Porcinos: 10 mL/animal, Caninos: 2 a 4 mL/animal, Felinos: 0,5 mL/animal. Directamente en la boca del animal.

Cada litro contiene:

Bromhexina Clorhidrato..... 5 g
Eucaliptol10 g

Frasco 1 lt.....14,80

Caneca 20 lt.....220,00

STREPTOSUL

Antibiótico
Polvo Soluble



Indicaciones:

Para el tratamiento de trastornos digestivos de origen infeccioso en cerdos, terneros y potros.

Vía oral.

Dosis inicial: 2 sobres por cada 50 kg de peso.
Dosis de mantenimiento: 1 sobre por cada 50 kg de peso.
Repetir la dosis cada 24 horas durante 3 a 5 días o al criterio del Médico Veterinario.

Cada 10 gramos contiene:

Oxitetraciclina HCl..... 1.00 g
Sulfadimetoxina sódica .. 1.38 g

Sobre 10 g 1,75

Caja disp. x 50 Sobres

SULFAVIT

Coccidiostático y Antibacteriano
Polvo Soluble



Indicaciones:

Tratamiento de coriza, salmonelosis y enteritis infecciosa. Actúa en las coccidiosis de los diferentes animales de granja y aves.

Vía oral

Disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento. Aves: 2 a 4 g por litro de agua.
Terneros y Ovejas: 2 g por 10 kg de peso.
Cerdos, Cuyes y Conejos: 3 a 6 g por kg de alimento. Tratamiento: 6 días.

Cada 100 g contiene:

Sulfadimetoxina sódica25 g
Vitamina A 600,000 UI
Vitamina K 500 mg

Sobre 20 g3,75

Caja disp. x 50 Sobres

SULTRIFIN



Antibiótico
Solución Inyectable



Indicaciones:

Efectivo frente a infecciones del tracto gastrointestinal, respiratorio, urogenital y afecciones podales.

Vía intramuscular profunda o intravenosa lenta.

Bovinos, Equinos y Porcinos: 3 mL por cada 50 kg de peso, cada 24 horas por 3 a 5 días.

Cada mL contiene:

Sulfadoxina..... 250 mg
Trimetoprim..... 50 mg

Frasco 20 mL 5,60
Frasco 50 mL 12,45
Frasco 100 mL 19,50

TETRAMAX



Antibiótico + Antiinflamatorio no esteroideo
Solución Inyectable



Indicaciones:

Se recomienda en infecciones de tracto respiratorio, urogenital y digestivo, como tonsilitis, neumonía, septicemia, metritis, carbunco bacteriano, carbunco sintomático, anaplasmosis.

Vía Intramuscular profunda.

Bovinos, equinos, porcinos, aves y caninos: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo.

Cada mL contiene:

Oxitetraciclina HCl. 100 mg
Diclofenaco sodico 1,25 mg
Lidocaina HCl. 12,50 mg

Frasco 10 mL 2,75
Frasco 20 mL 3,90
Frasco 100 mL 9,45

TICKXAN



Antiparasitario Externo
Solución Tópica



Indicaciones:

Para el control y tratamiento de ectoparásitos como: garrapatas, piojos y ácaros que afectan a los bovinos, ovinos y caprinos.

Vía tópica.

1 mL por cada 10 kg de peso vivo. A lo largo de la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola.
Repetir a los 35 días o de acuerdo al criterio del médico veterinario.

Cada 100 mL contiene:

Flumetrina 1 g
Fluazurón..... 2,5 g

Frasco 250 mL 27,45
Frasco 1 lt 89,00
Garrafa 5 lt..... 356,00

TILOSINA JB



Antibiótico de amplio espectro
Polvo Soluble



Indicaciones:

En enfermedades respiratorias crónicas (aerোসaculitis, sinusitis, neumonía) y digestivas ocasionadas por gérmenes sensibles al principio activo.

Vía oral.

Aves: 500 mg x litro de agua de bebida o 100 mg x kg de alimento.
Porcinos: 250 mg x litro de agua bebida. 1 kg x 10 toneladas de alimento.
Repetir cada 24 horas por 5, 7, 21 días o de acuerdo al criterio del médico veterinario.

Cada g contiene:

Tilosina Tartrato..... 1000 mg

Sobre 20 g 3,40
Caja disp. x 50 Sobres

Sobre 100 g 14,50
Tambor 15 kg.... 1.380,00

UNGÜENTO PARA UBRES



Antiinflamatorio y cicatrizante
Pomada



Indicaciones:

Ayudante en los procesos inflamatorios musculares, articulares, ubres con mastitis, grietas, escoriaciones epiteliales de pezones y traumatismos.

Tópico.

Previa limpieza de la zona afectada.
Puede repetirse por varias veces hasta que la inflamación desaparezca.

Cada 100 g contiene:

Aceite de Eucalipto..... 1 g
Fenol 1 g
Salicilato de Metilo..... 1 g
Alcanfor 1 g

Pomo 200 g..... 6,55
Pomo 800 g..... 25,80

VITAMAX REFORZADO



Vitaminas, Antibióticos y minerales
Polvo Soluble



Indicaciones:

Impulsa el crecimiento, estimula la producción de huevos, mejora la fertilidad, nacimiento e incubabilidad; corrige las deficiencias alimenticias.

Vía Oral.

Dosis preventiva 1 cucharada de 5 g en 6 litros de agua. Dosis Curativa: 2 cucharadas de 5 g en 6 litros de agua. Repetir durante 5 días.

Cada 500 g contiene:

Vitamina A 2207503 U.I.; Vitamina D3 110373 U.I.; Vitamina E 880 mg; Vitamina K880 mg; Vitamina B12 2207 ug Vitamina B2 1653 mg; Ácido Nicotínico 6897 mg; Pantotenato de Calcio 1873 mg; Vitamina C 543 mg; Vitamina B6 110 mg; Calcio como ion 5000 mg; Fósforo como ion 2493 mg; Penicilina 27593 mg Estreptomina Base 13.797 mg

Sobre 28 g 2,74
Caja Disp. x 50 sobres

Sobre 150 g 9,80

ZEROBICHOS



Antiparasitario interno y externo
Solución Inyectable



Indicaciones:

Para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares. Ectoparásitos: ácaros de la sarna, piojos y larvas de insectos (gusaneras, nuche). Ayudante en el control de garrapatas (Boophilus spp.)

Vía subcutánea en el pliegue del cuello o tras la escápula.

Bovinos y Ovinos: 1 mL por 50 kg de peso.
Porcinos: 1 mL por 33 kg de peso.
No aplicar en vacas en producción láctea.

Cada mL contiene:

Ivermectina..... 35 mg

Frasco 10 mL 3,40
Frasco 50 mL 12,55
Frasco 100 mL 20,80

Combo
ZEROBICHOS
Fco 500 mL
+ Fco 100 mL 85,50



Biológicos

New+Bron



Vacuna contra Newcastle y Bronquitis



Indicaciones:
Vacuna para la prevención e inmunización de aves reproductoras, pollas de reemplazo y pollos de engorde contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis infecciosa aviar.

Aplicación:
Vía ocular o nasal: usar el diluyente y colocar una gota.
Agua de bebida y aspersión: usar agua potable de buena calidad

Composición:
Virus vivo modificado atenuado de la enfermedad Newcastle tipo B1 cepa La Sota 1x10⁸ EID50.
Bronquitis infecciosa cepa Massachusetts 1x10⁸ EID50.

Frasco 25 DS.....3,35
Frasco 50 DS.....3,60
Frasco 100 DS.....4,35
Frasco 500 DS.....7,60
Frasco 1000 DS.....9,80

New-Vac



Vacuna contra Newcastle



Indicaciones:
Vacuna para la prevención e inmunización de aves reproductoras, pollas de reemplazo y pollos de engorde contra la enfermedad de Newcastle.

Aplicación:
Vía ocular o nasal: usar el diluyente y colocar una gota.
Agua de bebida y aspersión: usar agua potable de buena calidad

Composición:
Virus vivo modificado atenuado de la enfermedad de Newcastle tipo B1 cepa La Sota 1x10⁸ EID50.

Frasco 25 DS.....3,20
Frasco 50 DS.....3,45
Frasco 100 DS.....3,65
Frasco 500 DS.....5,70
Frasco 1000 DS.....6,50

TRIVIAR



Bacterina contra Cólera, Tifoidea y Pullorosis Aviar



Indicaciones:
Bacterina para la prevención del cólera, tifoidea y pullorosis en aves sanas, confiere buena protección.

Aplicación subcutánea en el cuello o pliegue del ala
Aves de 3 a 12 semanas: 0.5 mL.
Aves mayores a 12 semanas: 1 mL.
Revacunar cada 6 meses.

Cada dosis contiene:
Cultivos inactivados de Pasteurella Multocida (tipo I, II, III, IV, V)
10% Salmonella 10% Gallinarum y 10% Pullorum

Frasco 20 mL 20 DS.....4,15
Frasco 50 mL 50 DS.....5,95
Frasco 100 mL 100 DS...8,35

NEUMOBAC



Bacterina contra Neumoenteritis



Indicaciones:
Previene neumoenteritis (mal bobo) de los terneros recién nacidos. Alternativamente se puede vacunar las vacas 30 días antes del parto, para protección de las crías por medio del calostro.

Vía subcutánea.
Terneros: 5 mL
Vacas: 10 mL.

Cada dosis contiene:
Pasteurella Multocida 15%,
Pasteurella Haemolytica 15%,
Escherichia Coli 35%,
Salmonella Typhimurium 35%

Frasco 5mL 1 DS.....1,50
Caja disp. x 40 frascos

TRIBAC 8



Bacterina Polivalente contra Pasteurella y Clostridios



Indicaciones:
Para la prevención de las enfermedades ocasionadas por Pasteurellas y Clostridium: Carbón sintomático, edema maligno, enterotoxemias, riñón pulposo y hepatitis necrótica en bovinos, ovinos y caprinos.

Vía subcutánea.
Bovinos: 5 mL a partir de los 3 meses de edad en adelante.
Ovinos y Caprinos: 3 mL.

Cada dosis contiene:
Pasteurella Multocida 1x10⁹,
Pasteurella Haemolytica 5x10⁸,
Clostridium Chauvoei 1x10⁹,
Septicum 1x10⁹, Sordelli 1x10⁹, Novyi 5x10⁸, Perfringens tipo C y D 4x10⁸.

Frasco 50 mL 10 DS8,10
Frasco 100 mL 20 DS ..10,45
Frasco 250 mL 50 DS ..18,80
Frasco 500 mL 100 DS..31,25

PORCI-MIX



Bacterina Mixta Porcina contra Enteritis y Septicemia



Indicaciones:
Previene en cerdos jóvenes y adultos, las neumonías por pasteurellas y diarreas infecciosas por colibacilosis y salmonelosis.

Vía subcutánea.
Adultos: 5 mL.
Lechones de 45 días: 3 mL.
En animales primovacunados repetir a los 21 días.
Revacunar cada 6 meses.

Cada dosis contiene:
Cultivos inactivados de Pasteurella Multocida, Escherichia Coli, Salmonella Choleraesuis y Typhimurium.

Frasco 25 mL 5 DS ..3,70
Frasco 50 mL 10 DS ..4,65



Mascotas®

¡Cuidamos de tu mejor amigo!



Aminö-Vit



Multivitamínico Reconstituyente - Solución oral



Indicaciones:

Tratamientos de desequilibrio fisiológico ocasionados por deshidrataciones, diarreas persistentes, hemorragias, vómito, agotamiento por calor, estrés de trabajo y ejercicios prolongados.

Vía oral

Caninos: Pequeños de 1 a 5 kg: 10 mL. Medianos de 6 a 15 kg: 20 mL. Grandes de más de 16 kg: 30 mL.

Cada mL contiene:

Vitaminas: B2 0,04 mg; B12 0,05 mg; B6 0,1 mg; B3 1,5 mg; B1 0,1 mg; Ácido pantoténico 0,05 mg. Aminoácidos: Histidina 0,6 mg; Metionina 0,6 mg. Triptófano 0,6 mg; Cisteína 0,5mg; Treonina 0,8 mg; Isoleucina 0,85 mg; Arginina 0,85 mg; Fenilalanina 1,02 mg; Valina 1,4 mg; Lisina 1,7 mg; Leucina 1,36 mg; Sodio glutamato 1,36 mg. Minerales: Calcio 0,4 mg; Potasio 1,0 mg; Magnesio 0,2 mg; Sodio 0,5 mg. Dextrosa 50 mg.

Frasco 150 mL **7,30**

Blinker



Antiparasitario Externo Tableta masticable



Indicaciones:

Control de infestaciones por pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. Efecto antiparasitario por **aproximadamente 4 a 5 semanas**. Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

Vía oral

Caninos: Administrar tras la ingesta de alimentos en caninos mayores de 8 semanas.

Razas pequeñas desde 4,5 a 10 kg
Fluralaner 100 mg
Caja x 1 tableta **17,65**

Razas medianas desde 10 a 20 kg
Fluralaner 200 mg
Caja x 1 tableta **19,75**

Razas grandes desde 20 a 40 kg
Fluralaner 400 mg
Caja x 1 tableta **21,85**

Caja disp. x 12 cajas

Blinker^{LA}



Antiparasitario Externo Tableta masticable



Indicaciones:

Control de infestaciones por pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. Efecto antiparasitario por **aproximadamente 12 a 15 semanas**. Brinda protección indirecta contra la transmisión de Babesia canis, Anaplasma platys y Ehrlichia canis e infestaciones de Dipylidium caninum. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

Vía oral

Caninos: Administrar tras la ingesta de alimentos en caninos mayores de 8 semanas.

Razas pequeñas de 4,5 a 10 kg
Fluralaner 250 mg
Caja x 1 tableta **30,90**

Razas medianas de 10 a 20 kg
Fluralaner 500 mg
Caja x 1 tableta **33,90**

Razas grandes de 20 a 40 kg
Fluralaner 1000 mg
Caja x 1 tableta **36,50**

Caja disp. x 12 cajas

Blinker^{Plus}



Antiparasitario Interno y Externo Tableta masticable



Indicaciones:

Control de parásitos internos y externos (pulgas, piojos, garrapatas y ácaros). Prolongando el efecto antiparasitario por **aproximadamente 4 a 5 semanas**.

Vía oral

Caninos: Administrar tras la ingesta de alimentos en caninos mayores de 8 semanas.

Razas pequeñas de 4,5 a 10 kg Fluralaner 100 mg
Caja x 1 tableta .. **21,45**

Cada tableta contiene:
Fluralaner..... 100 mg
Pamoato de pirantel..... 90 mg
Praziquantel 45 mg

Razas medianas de 10 a 20 kg Fluralaner 200 mg
Caja x 1 tableta .. **22,75**

Cada tableta contiene:
Fluralaner..... 200 mg
Pamoato de pirantel..... 180 mg
Praziquantel 90 mg

Razas grandes de 20 a 40 kg Fluralaner 400 mg
Caja x 1 tableta .. **23,85**

Cada tableta contiene:
Fluralaner..... 400 mg
Pamoato de pirantel..... 360 mg
Praziquantel 180 mg

Caja disp. x 12 cajas

Blinker^{cat}



Antiparasitario interno y externo - Solución tópica



Indicaciones:

Actúa contra parásitos internos como anquilostomas y toxocaras, y externos como pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. Efecto por **12 semanas frente a parásitos externos** y 8 semanas frente a parásitos internos.

Vía tópica

Felinos: Aplicar todo el contenido de la jeringa, separando el pelo en la base del cráneo.

Cada mL contiene:

Fluralaner..... 280 mg
Moxidectina..... 14 mg

Para gatos de 1.2 a 2.8 kg
Jeringa x 0.4 mL..... **16,80**

Para gatos de 2.8 a 6.25 kg
Jeringa x 0.9 mL..... **18,90**

Carprövet 25 mg



Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético - Tabletas



Indicaciones:

Antiinflamatorio no esteroideo (AINE), con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Indicado en osteoartritis, displasia de cadera o codo, enfermedad del disco intervertebral, entre otras.

Vía oral

Caninos: 1/2 tableta por 5.7 kg de peso, cada 12 horas.
1 tableta por 5.7 kg de peso, cada 24 horas.
Repetir durante 5 a 7 días o de acuerdo al criterio del médico veterinario.

Cada tableta contiene:

Carprofeno.....25 mg

Frasco x 30 tab9,80

Carprövet 100 mg



Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético - Tabletas



Indicaciones:

Antiinflamatorio no esteroideo (AINE), con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Indicado en osteoartritis, displasia de cadera o codo, enfermedad del disco intervertebral, entre otras.

Vía oral

Caninos: 1/2 tableta por 22.7 kg cada 12 horas.
1 tableta por 22.7 kg cada 24 horas.
Repetir durante 5 a 7 días o de acuerdo al criterio del médico veterinario.

Cada tableta contiene:

Carprofeno..... 100 mg

Frasco x 50 tab37,50

EffiCat



Antiparasitario interno y externo - Solución tópica



Indicaciones:

Controla parásitos internos y externos como anquilostomas, toxocaros, pulgas, piojos y ácaros. Además, ofrece protección contra Dipylidium caninum y ayuda en la dermatitis alérgica por pulgas. **Efecto de 4 a 5 semanas.**

Vía tópica

Felinos: Aplicar todo el contenido de la jeringa, separando el pelo en la base del cráneo.

Cada mL contiene:

Imidacloprid..... 100 mg
Moxidectrina..... 8 mg

Para gatos de 0.91 a 4 kg
Jeringa 0.5 mL.....6,80

Para gatos de 4 a 8 kg
Jeringa 1 mL.....8,40

Ganadör



Reconstituyente - Solución Oral



Indicaciones:

Para el control del estrés y desequilibrios nutricionales, generados por situaciones de entrenamiento y ejercicios prolongados, ambientes adversos, agotamiento por calor, periodos de gestación y lactancia; además favorece la recuperación de animales convalecientes.

Vía oral, directamente en la boca del animal.

Caninos: 1 mL por cada kg de peso. Administrar cada 24 horas, durante 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Cada mL contiene:

Vitamina A 1.650 UI, Vitamina D3 20.000 UI, Vitamina C 0,125 mg, Vitamina B1 1,75 mg, Vitamina B2 2,50 mg, Vitamina B3 16,25 mg, Vitamina B5 7,50 mg, Vitamina B6 1,25 mg, Vitamina B8 0,01 mg, Vitamina B12 0,0014 mg, Arginina 6,10 mg, Cisteína 2,10 mg, Fenilalanina 3,00 mg, Histidina 3,00 mg, Isoleucina 6,00 mg, Leucina 8,70 mg, Lisina 9,50 mg, Metionina 2,20 mg, Treonina 5,00 mg, Triptófano 2,00 mg, Valina 6,20 mg, Citrato de sodio 0,30 mg, Cloruro de potasio 0,30 mg, Cloruro de sodio 0,50 mg.

Frasco x 150 mL 7,90

Garräkill Can pour on



Antiparasitario Externo - Solución tópica



Indicaciones:

Interviene en el control y eliminación de garrapatas, pulgas y piojos en caninos. Su acción residual le permite actuar por 4 semanas aproximadamente. Sirve como tratamiento de apoyo de la dermatitis alérgica causada por pulgas.

Vía tópica

Caninos: Aplicar todo el contenido de la pipeta desde la base del cuello hasta la base de la cola.

Cada mL contiene:

Imidacloprid..... 100 mg
Permetrina..... 500 mg

Perros hasta 5 kg
Pipeta 0.5 mL..... 5,35

Perros desde 5 kg hasta 15 kg
Pipeta 1.5 mL..... 6,30

Perros desde 15 kg hasta 30 kg
Pipeta 3 mL..... 7,80

Caja disp. x 8 cajas

Mascöta



Vitaminas y Minerales - Tabletas



Indicaciones:

Se utiliza como suplemento de vitaminas y minerales en perros y gatos en desarrollo, baja condición corporal por enfermedades extenuantes, estados de estrés durante la gestación y lactancia.

Vía oral

Caninos y Felinos:
Cachorros y gatos 1/2 tableta.
Adultos 1 tableta.
Animales en gestación y lactancia 2 tabletas de acuerdo a indicaciones del profesional.

Cada tableta contiene:

Vitaminas: A 1.000 UJ; D3 100 UJ; B1 1 mg; B2 1 mg; B12 5 ug; B6 0,5 mg; B8 10 mg; E 10 UJ; C 8 mg; D-Calpan 0,5 mg; Minerales: Gluconato de Calcio 127 mg; Sulfato de Cobre 20 mg; Cloruro de Magnesio 0,8 mg; Óxido de Zinc 130 mg; Sulfato de Hierro 1,2 mg; Fosfato Dicalcico 97 mg; E.D.D.17 mg.

Frasco 50 tab 11,20

Mäx-C



Inmuno Estimulante - Solución inyectable



Indicaciones:

Estimulante del sistema inmune, favorece la función sanguínea y la cicatrización, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, periodos de convalecencia o intoxicaciones.

Vía intramuscular profunda o intravenosa.

Caninos: 2 a 5 mL por día.
Felinos: 2 a 4 mL por día.
Manejar la dosis de acuerdo al criterio del médico veterinario.

Cada mL contiene:

Ácido ascórbico..... 100 mg

Frasco x 20 mL3,25

Melöxi-Flash



Antiinflamatorio, analgésico y antipirético - Suspensión oral



Indicaciones:

Para tratar el dolor e inflamación presentes en procesos infecciosos o traumáticos, procedimientos quirúrgicos o osteoartritis en caninos y felinos.

Vía oral

Caninos y Felinos: Directamente en la boca del animal.

Dosis inicial: Caninos 2 gotas por kg de peso. Felinos 3 gotas por kg de peso.

Dosis de mantenimiento: Caninos y felinos 1 gota por kg de peso. Repetir cada 24 horas de 2 a 4 días o de acuerdo al criterio del médico veterinario.

Cada mL contiene:

Meloxicam 1.5 mg

Gotero x 5 mL 2,75

Pulgä Kill

pour on



Antiparasitario externo - Solución tópica



Indicaciones:

Protege a los gatos de la reinfestación de pulgas, piojos y garrapatas hasta por 4 a 5 semanas.

Vía tópica

Felinos: Colocar entre las escápulas o el lomo, separe el pelo y vierta todo el contenido de la pipeta sobre la piel en la raíz del pelo.

Cada mL contiene:

Fipronil 100 mg

Methoprene 90 mg

Pipeta 0.50 mL 4,75

Caja disp. x 8 cajas

Pulgä Kill

pour on



Antiparasitario Externo - Solución tópica



Indicaciones:

Protege a los perros de la reinfestación de pulgas, piojos y garrapatas hasta por 4 a 5 semanas.

Vía tópica

Caninos: Colocar entre las escápulas o el lomo, separe el pelo y vierta todo el contenido de la pipeta sobre la piel en la raíz del pelo.

Cada mL contiene:

Fipronil 100 mg

Methoprene 90 mg

Perros hasta 10 kg

Pipeta 0.67 mL 5,35

Perros de 10.5 kg a 20 kg

Pipeta 1.34 mL 6,30

Perros desde 20 kg

Pipeta 2.68 mL 7,80

Caja disp. x 8 cajas

Pul-gä Kill



Antiparasitario Externo - Solución en spray



Indicaciones:

Para el control de pulgas, piojos y garrapatas en perros y gatos. Los elimina desde el primer día de su aplicación e interrumpe su ciclo evolutivo. Su acción dura hasta por 4 a 5 semanas.

Vía tópica/externa

Caninos y Felinos: Mediante rociado entre 15 y 20 cm de distancia de la piel.

Cada mL contiene:

Fipronil 2,50 mg

Methoprene 2,25 mg

Spray x 100 mL 9,50

Rayo

Dog & Cat / Puppy



Antiparasitario Interno - Suspensión oral



Indicaciones:

Para la eliminación de nematodos gastrointestinales, en caninos y felinos menores a un año de edad.

Vía oral

Caninos y Felinos: 1 mL por cada 1 kg de peso vivo, repetir la dosificación de acuerdo con el criterio del médico veterinario.

Cada 100 mL contiene:

Febantel 1,50 g

Pamoato de pirantel 1,44 g

Frasco x 20 mL 6,99

RayoCat



Antiparasitario Interno - Tabletas



Indicaciones:

Para la eliminación de nematodos y cestodos gastrointestinales en felinos, mayores a 1 mes de edad y 1.5 lb de peso.

Vía oral

Felinos: 1 tableta por cada 4 kg de peso corporal en una sola dosis.

Cada tableta contiene:

Pamoato de pirantel 115 mg

Praziquantel 10 mg

Caja x 2 tab 3,45

Caja disp. x 12 cajas

RayoDog

Perros pequeños y medianos



Antiparasitario Interno - Tabletas



Indicaciones:

Para la eliminación de nematodos y cestodos gastrointestinales en caninos de razas pequeñas y medianas, hasta 30 kg de peso, mayores a 3 semanas de edad y 1 kg de peso.

Vía oral

Caninos: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal en una sola dosis.

Cada tableta contiene:

Febantel 150 mg

Pamoato de pirantel 144 mg

Praziquantel 50 mg

Caja x 4 tab 4,75

Caja disp. x 12 cajas

RayoDog

Perros grandes



Antiparasitario Interno - Tabletas



Indicaciones:

Para la eliminación de nematodos y cestodos gastrointestinales en caninos de razas grandes a partir de 35 kg de peso y mayores a 3 semanas de edad.

Vía oral

Caninos: 1 tableta por cada 35 kg de peso corporal en una sola dosis.

Cada tableta contiene:

Febantel 525 mg
Pamoato de pirantel 504 mg
Praziquantel 175 mg

Caja x 2 tab 5,95
Caja disp. x 12 cajas

Relámpago



Antiparasitario Interno - Suspensión oral



Indicaciones:

Se utiliza para el control y tratamiento de los parásitos gastrointestinales (cestodos y nematodos) en caninos y felinos.

Vía oral

Caninos: 1 mL por cada 5 kg de peso.
Felinos: 0.25 mL por 1.25 Kg de peso.
No desparasitar cachorros menores de 4 semanas o gatitos menores de 6 semanas de edad.

Cada mL contiene:

Pamoato de pirantel..... 100 mg
Praziquantel 35 mg

Jeringa x 2 mL 1,95
Jeringa x 5 mL 2,80
Jeringa x 10 mL 3,70
Pomo x 100 mL 15,40

Sanõ Can

Jabón cosmético



Uso externo - Jabón cosmético



Indicaciones:

Recomendado para el baño rutinario de perros y gatos, brinda limpieza, brillo y un agradable aroma a su pelaje.

Vía tópica

Caninos y Felinos: Colocar cantidad suficiente de jabón sobre el pelaje mojado.

Cada g contiene:

Extracto de aloe vera 20 mg
Esencia amaderada..... 10 mg

Barra x 80 g 3,80

Sanõ Can

Jabón medicado



Antiparasitario Externo - Jabón medicado



Indicaciones:

Controla y elimina pulgas, piojos, garrapatas y ácaros presentes en perros y gatos.

Vía tópica

Caninos y Felinos: Mediante baño, dejar actuar el producto por 10 a 15 minutos.

Cada g contiene:

Permetrina 12.5 mg

Barra x 80 g 4,50

Sanõ Can

Shampoo medicado



Antiparasitario Externo - Shampoo medicado



Indicaciones:

Para el control de pulgas, piojos, garrapatas y ácaros causantes de la sarna en caninos y felinos.

Vía tópica

Caninos y Felinos: Aplique la cantidad suficiente de shampoo en el pelaje mojado.

Cada mL contiene:

Permetrina 10 mg
Excipientes c.s.p. 1 mL

Sachet x 40 mL
Caja disp. x 20 sachet
Frasco x 120 mL

Sanõ Can

Talco



Antiparasitario Externo - Talco



Indicaciones:

Para el control y eliminación de ectoparásitos tales como: pulgas, piojos y garrapatas en perros y gatos.

Vía tópica


Caninos y Felinos: Aplicar en todo el cuerpo del animal, abriendo el pelaje para que el producto entre en contacto con la piel.

Cada g contiene:

Propoxur 30,00 mg
Imidacloprid 1,60 mg

Frasco x 60 g 3,50
Frasco x 120 g 5,90

Sanõ Pet



Bactericida y Fungicida - Crema



Indicaciones:

Para tratamientos de enfermedades de la piel ocasionadas por hongos y bacterias.

Vía tópica

Caninos y Felinos: Aplicar la cantidad suficiente en la zona de la piel afectada.

Cada 100 g contiene:

Clotrimazol 1,000 g
Neomicina Sulfato 0,500 g
Gramicidina 0,025 g
Betametasona 0,040 g

Tubo x 30 g 6,25