

BENZAPEN L.A.[®]

F-02/2026

Antibiótico + antiinflamatorio no esteroideo



Indicaciones:

Para el tratamiento de neumonías, septicemias, neumoenteritis, panadizo, difteria, mastitis, leptospirosis, carbón sintomático, erisipela, causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos. Flunixin favorece la eliminación de procesos inflamatorios en menor tiempo.



Composición:

Penicilina G Procaínica	100.000	UI
Penicilina G Benzatínica	100.000	UI
Dihidroestreptomicina base	200	mg
Flunixin Meglumine	15	mg
Excipientes c.s.p.	1	mL



Periodo de Retiro:

En caso de reacciones alérgicas aplicar antihistamínicos o epinefrina.
Conserve en refrigeración entre 2° a 8°C.
No congelar.



Aplicación:

Vía intramuscular.



Dosis:

Bovinos - Equinos:

1 mL por 20 kg de peso.

Porcinos - Ovinos:

1 mL por 20 kg de peso.

Caninos:

1 mL por 10 kg de peso.

En todos los casos, repetir el tratamiento en 48 horas.



Advertencias:

En caso de reacciones alérgicas aplicar antihistamínicos o epinefrina.
Conserve en refrigeración entre 2° a 8°C.
No congelar.



Registro:

Ecuador Reg. No. 10A-6914-AGROCALIDAD
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N078249
Registro Sencamer Nro.: CPE0511220836
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 000278/03
Guatemala MAGA No. EC432-67-02-11779
Costa Rica Reg. M.A.G # EC4-66-1-6694
Perú Reg. SENASA No.F.F4.01.I.0012
República Dominicana Reg. No. 3302
Panamá RF-9072-21

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médica.



Presentación:

Frasco x 10 mL
Frasco x 50 mL
Frasco x 100 mL



Aplicalo en:



📍 Quito: Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

☎ PBX: +593 2 399 7000



Salud
Animal

Consulta por más de nuestros **productos farmacéuticos veterinarios**

🌐 www.jamesbrownpharma.com