

FLUVIPEN®

Antiinflamatorio + Antiinflamatorio esteroide



Indicaciones:

Para el tratamiento de las enfermedades causadas por bacterias susceptibles a las Penicilinas y Dihidroestreptomicina como: Mastitis, Metritis, Neumonías, Septicemias, Pododermatitis, Leptospirosis, tratamientos quirúrgicos post operatorios e involución uterina después del parto.



Composición:

Cada mL contiene:

Penicilina G Procaínica	200.000 U.I.
Dihidroestreptomicina	300 mg
Flumetasona	0.065 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL



Aplicación:

Vía Intramuscular profunda.
Para reconstituir introduzca el diluyente en el frasco que contiene el polvo y agite hasta obtener una suspensión uniforme.



Dosis:

Bovinos - Equinos:

1 mL por 20 kg de peso.

Porcinos - Ovinos:

1 mL por 15 kg de peso.

Caninos:

1-2 mL por 5 kg de peso.

Felinos:

0,5-1 mL por 5 kg de peso.

Adminístrese de 3 a 5 días



Advertencias:

En caso de reacciones alérgicas aplique antihistamínicos o epinefrina. No aplicar en hembras en el último tercio de gestación, puede ocasionar abortos. Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médica



Periodo de Retiro:

Leche: 3 días.

Carne: 28 días.



Registro:

Ecuador Reg. No. 2C1-3396-AGROCALIDAD
Guatemala MAGA No. MV-EC432-07-01-6945
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005551/13
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N078242
Registro Sencamer Nro.: CPE0511220807
Perú Reg. SENASA No. F.F6.13.I.0006
Panamá: MV-9073



Presentación:

Frasco x 20 mL



Aplicalo en:



**Salud
Animal**