

Fortipen®

F-02/2026

Antibiótico + Antiinflamatorio no esteroideo



Indicaciones:

Acción efectiva contra bacterias gram positivas y negativas causantes de neumonías, septicemias, panadizos, mastitis, actinomicosis y leptospirosis. También efectiva en infecciones del ombligo, castraciones y otras intervenciones quirúrgicas en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.



Composición:

Cada mL contiene	
Penicilina G Procaínica	150.000 U.I.
Penicilina G Sódica	150.000 U.I.
Estreptomicina	300 mg
Diclofenaco Sódico	15 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL



Aplicación:

Vía intramuscular profunda.
Para reconstituir introduzca el diluyente en el frasco que contiene el polvo y agite hasta obtener una suspensión uniforme.



Dosis:

1 mL por cada 20 kilos de peso
Bovinos: 20 mL
Equinos: 15 mL
Novillos - Potros: 10 mL
Terneros - Ovejas - Porcinos: 3-8 mL
Aplicar cada 12 horas por un máximo de 5 días o a criterio del Médico Veterinario.



Advertencias:

En caso de producirse reacciones alérgicas aplique antihistamínicos o epinefrina. Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Venta bajo receta médica.



Periodo de Retiro:

Carne 28 días.
Leche 3 días.



Registro:

Ecuador Reg. No. 2C4-8800-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005550/13
Importado y Distribuido por GUC SRL
Venezuela Reg.No. INSAI2041PI33N077948
Registro Sencamer Nro.: CPE0511220849
Perú Reg. SENASA No. F.03.13.I.1336
Guatemala MAGA No. MV-1818
Panamá: MV-3830



Presentación:

Frasco x 20 mL



Aplicalo en:



Salud
Animal

📍 Quito: Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

☎ PBX: +593 2 399 7000

Consulta por más de nuestros **productos farmacéuticos veterinarios**

🌐 www.jamesbrownpharma.com