

OXITER® 200 L.A.

F-02/2026

**Antibiótico de larga acción
+ Antiinflamatorio no esteroideo**



Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro más antiinflamatorio no esterooidal, para el tratamiento de infecciones por gérmenes Gram positivos y negativos causantes de la pasteurelosis, metritis, colibacilosis, salmonelosis, anaplasmosis, pododermatitis, difteria y neumonías en bovinos, porcinos y equinos.



Composición:

Cada mL contiene:	
Oxitetraciclina base	226.5 mg
Flunixin Meglumine	10 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL



Aplicación:

Vía intramuscular profunda, intravenosa lenta con solución dextrosada, en lavados uterinos diluidos en agua destilada.



Dosis:

Bovinos - Equinos: 1 mL por cada 20 kg.
Porcinos: 0.5 a 1 mL por cada 10 kg de peso.
Repetir el tratamiento a las 48 horas.



Advertencias:

La administración intramuscular en bovinos en algunos casos puede causar irritación y un cierto grado de necrosis, por lo que en esta especie debe preferirse la vía intravenosa. No administrar a hembras gestantes, no usar en caso de daño renal o hepático severo. No aplicar en equinos en entrenamiento en los 8 días previos a la carrera. No administrar junto con penicilinas, antiácidos, hierro y calcio.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médica.



Periodo de Retiro:

Carne: 28 días.

Leche: No administrar a vacas en producción de leche destinada al consumo humano.



Registro:

Ecuador Reg. No.:
2C1-8A4-11699-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005553/13
Guatemala MAGA. No.
MV-EC432-07-01-3027
República Dominicana Reg. No. 12753
Perú Reg. SENASA No. F.71.01.I.0080
Panamá: MV-8092



Presentación:

Frasco x 20 mL
Frasco x 100 mL
Frasco x 250 mL



Aplicalo en:



**Salud
Animal**

📍 Quito: Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

☎ PBX: +593 2 399 7000

Consulta por más de nuestros **productos farmacéuticos veterinarios**

🌐 www.jamesbrownpharma.com